



Ana Kristell Gómez Castillo.

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía Clasificación del DSM-V.

Psiquiatría.

5 "B"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas. A 12 de septiembre, 2024.

TRASTORNOS Depresivos

SE CARACTERIZAN POR:

- Depresión
- Tristeza
- Irritabilidad
- Retraso psicomotor



EN CASOS GRAVES

Ideación suicida



Trastorno depresivo mayor

Estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por las actividades habituales

- Síntomas cada día
- No hay pensamientos de suicidio
- No hay pensamientos de muerte



DIAGNOSTICO

Se descarta si los síntomas son consecuencia de un duelo normal y si existen síntomas psicóticos en ausencia de síntomas del estado de ánimo

Trastorno depresivo persistente o distimia

Forma de depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos durante 2 años.

El individuo presenta

Estado deprimido uno cada 24 horas

Dos síntomas más de depresión



Trastorno disfórico premenstrual

Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación



Remiten cuando acaba el ciclo menstrual.



Síntomas

- Irritabilidad
- Labilidad emocional
- Cefalea
- Ansiedad o Depresión

TRASTORNO DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia

• Alcohol

• Medicamentos




TRASTORNOS Depresivos

Trastorno depresivo debido a otra afección médica


Es un estado secundario a una enfermedad

EJEMPLO
• Hipotiroidismo
• Síndrome de Cushing



Otro trastorno depresivo especificado

EPISODIO DEPRESIVO RECURRENTE
• Estado depresivo de al menos 2-13 días
• Aparece por lo menos una vez al mes



EPISODIO DEPRESIVO DE CORTA DURACIÓN
• Estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días.
• No se observan recurrencias



Trastorno depresivo no especificado

Melancolía



- Desesperanza
- Retraso psicomotor
- Alto riesgo de suicidio



Depresión atípica

- Animo deprimido
- Ganancia de peso
- Hipersomnia




Con inicio en el periparto

- Período del parto o en el mes siguiente de dar a luz



Con patrón estacional

- Animo deprimido aparece en un período determinado del año



Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo

Se presenta en niños mayores de 6 años de edad y menores de 18 años



Colera intensos



Irritabilidad crónica

Estado de ánimo irascible.



Referencias

Sadock, B. J. (2019). *Manual de bolsillo. PSIQUIATRIA CLINICA*.
Barcelona, España.: 6a Edición.