



**Nombre del alumno: Rashel Citlali
Rincon Galindo**

**Nombre del profesor: Cristian
Jonathan Aguilar Ocampo**

Nombre del trabajo: Infografía


Materia: Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5°


Grupo: B


Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de septiembre de 2024.



TRASTORNOS DEPRESIVOS TRASTORNOS DEPRESIVOS

DEPRESIÓN, TRISTEZA, IRRITABILIDAD,
RETRASO PSICOMOTOR, SUICIDIO





T. DEPRESIVO MAYOR



ESTADO DE ÁNIMO DEPREMIDO O LA PÉRDIDA DE INTERÉS O PLACER POR LAS ACTIVIDADES HABITUALES.

T. DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA

LA DISTIMIA ES UNA FORMA DE DEPRESIÓN LEVE Y CRÓNICA QUE SE PROLONGA POR LO MENOS DURANTE 2 AÑOS.

T. DISFÓRICO PREMENSTRUAL




APARECE APROXIMADAMENTE 1 SEMANA ANTES DE LA MENSTRUACIÓN.

T. DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS



SE CARACTERIZA POR UN ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO AL CONSUMO DE ALGUNA SUSTANCIA





T. DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

ES UN ESTADO SECUNDARIO A UNA ENFERMEDAD



OTRO TRASTORNO DEPRESIVO ESPECIFICADO



ESTA CATEGORÍA DIAGNÓSTICA INCLUYE DOS SUBTIPOS:

- 1. EPISODIO DEPRESIVO RECURRENTE**
- 2. EPISODIO DEPRESIVO DE CORTA DURACIÓN**

T. DEPRESIVO NO ESPECIFICADO

SE COMPONE DE 4 SUBTIPOS:

- 1. MELANCOLÍA**
- 2. DEPRESIÓN ATÍPICA**
- 3. CON INICIO EN EL PERIPARTO**
- 4. CON PATRÓN ESTACIONAL**

T. DE DESREGULACIÓN DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE ÁNIMO



SE PRESENTA EN NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS Y MENORES DE 18 AÑOS