



Axel Adnert Leon Lopez

Dr.cristian jonathan aguilar ocampo

trastorno esquizofreniforma

psiquiatria

5°

"B"

Comitán de Domínguez Chiapas 08/10/ 2024

TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME



DEFINICION

- Enfermedad de inicio súbito y evolución benigna asociada a síntomas del estado de ánimo y obnubilación. Síntomas similares a los de la esquizofrenia, excepto en que duran al menos 1 mes, pero menos de 6 meses

EPIDEMIOLOGIA

- es muy comun que se presente en adolescentes y personas jovenes adultas, naturalmente prevalece mas en hombres que en mujeres.



ETIOLOGIA

- Se desconoce la causa del trastorno esquizofreniforme. En general, algunos pacientes presentan un trastorno similar a la esquizofrenia, mientras otros muestran uno similar a un trastorno del estado de ánimo.

CUADRO CLINICO

- síntomas psicóticos (alucinaciones, delirios, discurso y conducta desorganizados o síntomas negativos). los pacientes con trastorno esquizofreniforme vuelven a su estado inicial en 6 meses.



CUADRO CLINICO

- Algunos pacientes presentarán un segundo o tercer episodio durante el cual se deteriorarán hasta alcanzar una forma más crónica de esquizofrenia

DIAGNOSTICO

- un episodio del trastorno, dura al menos de un mes y menos de 6 meses.
- inicio de sintomas dentro de las primeras 4 semanas.
- confusion o perplejidad al largo de un episodio
- ausencia de aplanamiento y embotamiento afectivo



TRATAMIENTO

- antipsicóticos (p. ej., risperidona) durante 3-6 meses
- prueba con litio, carbamazepina o valproato puede estar justificado para el tratamiento y la profilaxis si un paciente presenta un episodio recurrente
- TEC puede estar indicada en algunos pacientes, en especial los que presentan rasgos catatónicos o depresivos intensos.

bibliografia

kaplan y sadock: manualdepsiquiatria. ciencias de la conducta y psiquiatria clinica. 11 edicion.