



Esmeralda Jiménez Jiménez

**Dr. Christian Jonathan Aguilar
Ocampo**

Infografía de los Trastornos Depresivos

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de Septiembre de 2024

DEPRESIVOS

se caracterizan por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor y, en los casos graves, ideación suicida.

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

Depresión mayor en un estado de:

- ánimo deprimido
- la pérdida de interés o placer por las actividades habituales

Dx:

se descarta si los síntomas son consecuencia de un duelo normal y si existen síntomas psicóticos en ausencia de síntomas del estado de ánimo

prácticamente cada día, excepto las ideas de suicidio



TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA.

distimia es una forma de depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos durante 2 años.

Estado de ánimo:

- deprimido casi las 24 h del día y
- al menos dos síntomas más de depresión.



TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL.

• 1 semana antes de la menstruación se caracteriza por:

- irritabilidad,
- labilidad emocional
- cefalea y ansiedad o depresión,

que remiten cuando acaba el ciclo menstrual.



MENSTRUAL CRAMPS



TRASTORNO DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS.

caracteriza por un estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia


(p. ej., alcohol) o medicamento (p. ej., barbitúricos).



Trastornos Depresivos

Trastorno depresivo debido a otra afección médica.

- Estado secundario a una enfermedad (p C hipotiroidismo o síndrome de Cushing).



Otro trastorno depresivo especificado.

Dos subtipos:

(1) episodio depresivo recurrente, que supone un estado depresivo de al menos 2-13 días y que aparece por lo menos una vez al mes

(2) episodio depresivo de corta duración, en el que el estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días, pero no se observan recurrencias



Trastorno depresivo no especificado.

4 subtipos básicos:

(1) melancolía, se caracteriza por desesperanza, anhedonia y retraso psicomotor, e incluye también un alto riesgo de suicidio

(2) depresión atípica, trastorno de ánimo deprimido asociado con ganancia de peso en lugar de pérdida, y con hipersomnía en lugar de insomnio;

(3) con inicio en el periparto, en el que la depresión tiene lugar en el periodo del parto o en el mes siguiente de dar a luz (en el DSM-IV se denomina depresión posparto)

(4) con patrón estacional, estado de ánimo deprimido aparece en un periodo determinado del año, por lo general en el invierno



Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo.

nuevo diagnóstico ÷

Se presenta en:

- niños mayores de 6 años de edad y
- menores de 18 años,

caracteriza por:

- accesos de cólera intensos,
- irritabilidad crónica y
- estado de ánimo irascible.

