

**Diego Caballero Bonifaz**

**DR: Romeo Antonio Molina Román**

**Mapas conceptuales**

**Clínica quirúrgica**

**5**

**B**

PASIÓN POR EDUCAR

# Evaluación y manejo inicial

## Fase prehospitalaria

Diseñado para notificar al hospital receptor antes que el paciente se traslade

Durante esta fase, el personal enfatiza el mantenimiento de la vía aérea, el control del sangrado externo y el shock,

## Revisión primaria (ABCDE)

Triage

Se basa en ABCDE

- 1-Vía aérea con restricción de movimiento de columna
- 2-Breathinh (respiración)
- 3-Circulacion con control hemorragia
- 4-Deficit (evaluación estado neurológico)
- 5-exposicion

## Fase hospitalaria

planificación previa al arribo de los pacientes traumatizados es esencial

Preparación hospitalaria

1. Disponibilidad área reanimación
2. Equipo y vía aérea adecuado
3. Soluciones cristaloides
4. Protocolo asistencia medica
5. Acuerdos de traslado

# Evaluación y manejo inicial

Anexos a revisión primaria  
con reanimación

1. Monitoreo electrocardiográfico
2. Oximetría pulso
3. Frecuencia respiratoria
4. Sonda vesical
5. Sonda gástrica
6. Evaluación radiológica y estudios diagnósticos

Elementos clínica

Nivel conciencia  
Perfusión

revisión secundaria

No empieza hasta que  
la revisión primaria  
(ABCDE) haya finalizado

Historia clínica

Exploración física

# Colitis ulcerosa

## Definición y etiología

es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino de causa desconocida que afecta generalmente al recto y al resto del colon

## Epidemiología y datos

México  
Sugieren un incremento de hasta tres veces la tasa ajustada de incidencia de la CUCI en los últimos

En México el pico de mayor incidencia es entre los 20-40 años de edad.

## Cuadro clínico

Dolor abdominal  
Perdida de peso  
Diarrea sanguinolenta  
Calambres abdominales  
Tenesmo  
Fiebre

## Diagnostico

historia clínica

Sigmoidoscopia

## Complicaciones

Megacolon toxico  
Hemorragia  
Perforación  
Cancer

## Tratamiento

Colectomía + ileostomía terminal

Tratamiento farmacológico

Mesalazina dosis 2-4 g y azitioprina 1.5 a 2.5 mg/kg/día