



Carlos Alberto Hernández Meza

DR. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Medicina física y de rehabilitación

Grado: 5

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: B

Artritis Septica
 Enfermedad que tiene serias
 consecuencias sino se diagnostica
 tempranamente

- factores de riesgo
- Edad (< 80 o > 80 años)
 - nivel socioeconómico bajo
 - Prematuros
 - Hemodialis
 - Sepsis
 - Ulceros cutáneos
 - Artritis reumática

→ Tratamiento

- médico
- Quirúrgico

→ Inmesa dicloxacilina y
 Cefotaxima, penicilina

→ Limpieza quirúrgica
 artroscópica

- Artrotomía
- Drenaje articular



→ Clasificación

- Según el microorganismo:
 - no gonocócica: Staphylococcus aureus
 - Streptococcus
 - Bacilos gram negativos


Gonocócica: Neisseria gonorrhoeae

• Según la fisiopatología:

- Hematógeno
- Por contigüidad
- Por invasión directa

→ Signos y Síntomas

- Dolor
- Fiebre
- Derrame articular
- Signos de flogosis



→ Dx

- Clínico
- Estudios Complementarios
- BH, VSG y PCR
- Rx, TC, RMC

OSTEOMIELITIS

- Infección de un hueso causada por un organismo infeccioso
- Es de características inflamatorias de hueso

→ Epidemiología

- más frecuente en el sexo masculino

→ factores de riesgo

- Sistémico
- Local
- Staphylococcus aureus
- Pseudomona aeruginosa

→ fisiopatología

- Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección
- Propagación hematológica de la infección



→ Clasificación

- aguda
- sub aguda
- Crónica
- Exógena

Según su estudio Clínico

- Homatogénea
- Secundaria a un foco contiguo
- Inoculación directa

Según su patogénesis

→ Diagnóstico

- Analítico y microbiológico
- uso de hemograma, cultivos de bacterias
- Proteína C Reactiva (PCR) e (ESR)

→ Tratamiento

- Antibióticos de amplio espectro
- menores de 5 años e inmunosupresión
- Cloxacilina 2gr/4h + Cefotaxima 2gr
- Cloxacilina 2gr/4h CV + " " 2h
- mayores de 5 años
- uso de drogas EV
- Procedimientos
- Drenaje de abscesos
- Estabilidad de la fx