Diego Alejandro Flores Ruiz

Actividad

Medicina del trabajo

Quinto B

Comitán de Domínguez Chiapas a 6 de diciembre del 2024.

Neumólogos laboral

NEUMOCONIOSIS

Acumulación de polvo en los pulmones y respuesta tisular: a ya presente

- Polvo
  - Cantidad de partículas sólidas dispersas en el aire y procedimiento de dispersión
- Aclarado
  - 90% de las partículas de hollín de diámetro
  - 75% de los de la Ciclosi de diámetro
  - 50% de los de hollín de diámetro
  - No existe aclarado en el diámetro mayor de fibra de diámetro
- Alveolo
  - Es una forma de fibrosis pulmonar producida por polvos inorgánicos que contiene sílice libre cristalina
  - Clasificación
    - Cristalina
      - Cuarzo, trimitita, cristobalita
    - Microcristalina
      - Diatomitas ondulan de cuarzos yeeba por silice amorfa, como el poderosa y el silex
    - Amorfa
      - Forma no cristalina. Es el metaglas y tiene fácil compuestos por resto de requerido de alumnos
- Neumoconiosis
  - Antracosis
    - Neumoconiosis de los mineros de carbón
    - Microorganismos contra partículas negras. Es el polvo de carbón que se encuentra en tejidos de los neumólogos adquiridos de los mineros de carbón, en los ganglios peribronquiales, y en los macrófagos pleurales
  - Talcosis
    - La composición de talco comercial varía considerablemente entre las distintas regiones y las diferentes minas
  - Bisilicosis
    - Su materia crn la bisilicita metalúrgica de aluminio y ferrosilicio. Es el metaglas y tiene fácil detalle en silicon compuesto y por hierro
  - Silicosis
    - La inhalación de hierro puede dar lugar a una fibrosis pulmonar difusa y nodular que puede ocasionar una insuficiencia cardiaca que hasta buen causal forma aerosanitaria

ENFERMEDAD PULMONAR PRODUCIDA POR GASES TÓXICAS, HUMOS Y AEROSOLES

- Gases y vapores
  - Nx2
  - Sx2
  - Mn3
  - Sn2
  - Cl2
  - COCO
  - Hasta el punto de vista geográfico está limitado. Los primeros casos están relacionados con el desarrollo de ARDS
- Polvos
  - Mercurio
  - Zinc
  - Magnesio
  - Cadmio
  - Níquel
  - Vanadio
  - Los humos y los fumos gaseosos de varias sustancias pueden producir edema pulmonar agudo, alveolitis de depósito inapetencia del ARDS, bronquiolitis obliterante organizada, neumonía intersticial y fibrosis pulmonar
- Humos
  - Otro gran número de sustancias crea que incluyen humos de metales, plásticos y productos con vapores de product oxidantes contaminantes
  - Anticoncepcionales
  - Herbicidas
  - Antiparasitarios
  - Antiparasitarios
  - Antiparasitarios
  - Desinfectantes y cloaheserina
  - Avitral
  - Ácido erótico
  - Monofractures de microescrónica
  - Dibromo
  - Síndrome de aclyatrit

NEUMOCOSIS POR HIPERSENSIBILIDAD

- Enfermedad inflamatoria que afecta las partes distales del pulmón
- Proceso/s que indujeron reposito de las partículas orgánicas o compuesto químicos
  - Conocidos como
    - Alveolitis alérgica extrínseca
    - Alveolitis
    - Partes distales del pulmón
      - Bronquiolos
      - Alveolo
      - Espacio intersticial
- Microorganismos
  - Bacterias termofílicas
  - Hongos
  - Hongos termofílicos
  - Proteínas animales
  - Sustancias químicas
  - Dx
    - Baja peso molecular
    - Como
      - Isocianatos
      - Trabajadores de fábricas
      - Dx
      - Manipulación de pinturas
- Pulmón de trabajador
  - Agente
    - Isocianato
  - Factor de riesgo
    - Fábricas de pinturas
  - Agente
    - Adhesivos
  - Factor de riesgo
    - Esquimos
  - Nh por antibióticos trimetílico
  - Agente
    - Antibióticos trimetílicos
  - Factor de riesgo
    - Reales-apoxi

SÍNDROME EDIFICIO ENFERMO

- Historia
  - Décadas de 1970
  - Sx
    - Se vieron
  - Brotes de enfermedad
  - Sx
  - Trabajadores de edificio
  - Dx
  - Oficinas no contaminadas
  - Dx
  - Procesos industriales
- CDC
  - Introduce a término «síndrome de edificio enfermo»
  - Sx identifica el contaminante
  - Dx
    - Medirse o organizar
  - Sx
    - Décadas de 1980
  - Dx
    - Un estudio epidemiológico
- Etiología
  - 84%
    - Sx identifica el contaminante
  - 10%
    - Sx genera con ventilación mecánica
  - 1%
    - No se establecerá origen
- Clínica
  - Irritación
    - Ojos/nariz
    - Mucosas
      - Nariz
      - Ojos
      - Tracto respiratorio
        - Superior
        - Inferior
  - Cutáneas
  - Cefaleas
  - Letargia
  - Patología general
  - Sx dolor
    - Varias causas ambientales
    - Sx
    - Diversas variables
      - Dx
      - Fisica
      - Social
- Considerando
  - Resultado de la interacción
    - Dx
      - Ambiente
        - Físico-social
        - Salud del individuo
- Epidemiología
  - Constituyen uno de los procesos patológicos
    - Mesa fría cuentos
      - Sx
      - Enfermedades respiratorias
      - Dx
      - Organizatural
- Cáncer de pulmón
  - Supone aproximadamente
    - Sx
      - Dx
      - Mesotelioma maligno
- NEUMOLOGÍA LABORAL II
  - Etiología
    - Interacción entre factores endógenos y exógenos
    - Factores endógenos
      - Genéticos
    - Factores exógenos
- Asbesto
  - Como material de aislamiento térmico, eléctrico y acústico
- Radón
  - Es un producto de descomposición del radio
- Arsénico
  - La exposición ambiental arsénico está presente
- Berilio
  - La exposición ocurre en la minería
- Sílice
- Asgarita

Presented with xmind