



**JUAN PABLO ABADIA LOPEZ**

**DR. ALEXANDRO ALBERTO TORRES  
GUILLEN**

**Mapas**

**MEDICINA INTERNA**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**5**

**B**

Comitán de Domínguez Chipas a 12 de septiembre del 2024

## ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHOLICA

Enfermedad más frecuente. Como la gran mayoría de los  
Personas ingiere el consumo de cantidades perjudiciales de  
alcohol (definidos como más de una bebida al día  
o de dos bebidas al día en varones)

Relacionado a resistencia periferica a Insulina y/o obesidad

3 TIPOS de lesiones

1. Gotas grasas hepáticas
2. Esteatohepatitis (Incremento el riesgo)
3. Cirrosis

En transporte VLDL  
HDL

Circulación del sistema porta.

HDL tipo proteína de alta densidad, transportan  
el colesterol de otras partes del cuerpo  
al hígado, "Donde son eliminados"

Esto lo conocemos como transporte reverso de  
Colesterol

- Colesterol HDL es conocido como bueno a sus  
niveles altos Puede reducir el riesgo de enfermedad  
Coronaria y accidente cerebrovascular.

JUAN PABLO JP

29/11/2024

ABADIA JV

Factores de riesgo AN



## HEPATOLOGIA HEPATICA

- En Mexico la mitad de las muertes debidas a cirrosis hepaticas se relacionan con el consumo de alcohol
- Las mujeres son más susceptibles a la lesion hepatica por alcohol que los varones.

Los VIRQUES 40 - 80 mg/dia de etanol causa hígado sano; 160 g/dia por 10-20 años causa hepatitis o cirrosis. Son el 15% de alcoholicos desarrollo hepatopatia alcoholica

1 hígado 3 Síndromes 2 hepatosis

## CONSIDERACION

- En Mexico la mitad de las muertes debidas a cirrosis hepaticas se relacionan con el consumo de alcohol
- Las mujeres son más susceptibles

# Patología Hepática Cap 357

4

- El hígado es el órgano más grande del organismo
- Pesa entre 1 y 1.5 kg
- Representa de 1.5 a 2.5 % de masa corporal magra

Recibe un doble aporte sanguíneo

20% del flujo sanguíneo es sangre rica en oxígeno  
Procede de la Arteria Hepática

80% es rica en nutrientes que proviene de la vena porta que se origina en estómago, Intes, Páncreas y bazo.

Términos Pericólicos En el hígado está organizado en  
Acinos que reciben sangre de la Arteria hepática y  
de la vena porta Proximal de los Acinos portales a  
porta (zona 1) flujo flujo por sinusoides (zona 3)

Los hepatocitos que están en el área intermedia constituyen la  
zona 2

## MACROFAGOS HEPÁTICOS

Cel. Kupffer Situadas en el espacio vascular  
sinusoidal y representan el principal grupo de  
macrófagos Res en el cuerpo

Las Cel. Estrelladas están localizadas en el espacio  
Dise

