



Nombre del alumno:

Miguel Angel Calvo Vazquez

Nombre del profesor:

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Nombre del trabajo: Infografía

Materia: Psiquiatría

Grado: 5°

Grupo: C

TRASTORNOS DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS



Esquizofrenia

Es un trastorno crónico en el que generalmente existen alucinaciones o delirios acusados

Esquizofrenia

Los médicos reconocen tres fases de la alteración:

- Prodrómica o de deterioro funcional anterior a la aparición de la fase psicótica activa
- Activa : en la cual los síntomas deben estar presentes durante un mínimo de 1 mes
- Fase residual: alteración funcional y emocional, del conocimiento y de la comunicación



Trastorno delirante

Se caracteriza por creencias fijas persistentes como situaciones que podrían presentarse en la vida real, como infidelidad, ser perseguido o tener una enfermedad

Trastorno delirante

La **paranoia** es una enfermedad caracterizada por el desarrollo gradual de un sistema de delirios elaborado, con ideas de grandiosidad, que muestra un curso crónico



Trastorno psicótico breve

Este trastorno requiere la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o catatónico, como mínimo durante 1 día, pero menos de 1 mes.

Trastorno esquizofreniforme

Se caracteriza por síntomas de la fase activa de la esquizofrenia como delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos, pero dura entre 1 y 6 meses,





Trastorno esquizoafectivo

Se observan delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos, así como por la presencia de un síndrome maniaco o depresivo durante un mínimo de 2 semanas

Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos.

Son trastornos con síntomas de psicosis provocados por sustancias psicoactivas



Trastorno psicótico debido a otra afección médica

- Se caracteriza por alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica
- Como lo son: epilepsia del lóbulo temporal, avitaminosis, meningitis

Catatonía

- Se caracteriza por la presencia de alteraciones motrices como la catalepsia, el mutismo, la adopción de una postura y el negativismo
- Puede asociarse con, esquizofrenia o trastorno bipolar
- Se puede deber a una neoplasia, traumatismo craneoencefálico o encefalopatía hepática



Trastorno psicótico breve

Este trastorno requiere la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o catatónico, como mínimo durante 1 día, pero menos de 1 mes.

