



**Jennifer Guadalupe Espinosa perez**

**DR.:Cristian Jonathan Aguilar  
ocampo**

**Espectro de la esquizofrenia y otros  
aspectos psicóticos**

**Materia:psiquiatría**

**Grado: 5**

**Grupo: “C”**

2024

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre del

# ESPECTROS DE LA EXQUIZOFRENIA

## Y OTROS TRANSTORNOS PSICOTICOS

incluyen ocho trastornos específicos esquizofrenia, trastornos esquizofreniforme, esquizoapectivo, delirante, psicótico breve, psicótico debido a sustancias/medicamentos, psicótico debido a otra afección médica y catatonía

### ESQUIZOFRENIA

Es un trastorno crónico en el que generalmente existen alucinaciones o delirios acusados tres fases de la alteración, a pesar de que no se incluyen en el DSM-5® como fases separadas: as: prodrómica o de deterioro funcional anterior a la aparición de la fase psicótica activa; activa, en la cual los síntomas (delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento altamente desorganizado o síntomas negativos, como afecto aplanado, abulia y alogia) deben estar presentes durante un mínimo de 1 mes y, tras esta etapa, la fase residual.

### TRASTORNOS PSICOTICO DEBIDO A OTRA AFECCION MEDICA

Se caracteriza por alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica

### TRANSTORNOS DELIRANTES

- Creencias fijas persistentes
- se refieren a situaciones que podrían presentarse en la vida real, como infidelidad, ser perseguido o tener una enfermedad, que no se consideran creencias extravagantes general, con ideas de grandiosidad, que muestra un curso crónico, mientras que el resto de la personalidad permanece intacto.

### TRASTORNO PSICOTICO BREVE

requiere la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o catatónico, como mínimo durante 1 día, pero menos de 1 mes. Puede ser precipitado por un factor estresante vital externo

### TRASTORNO ESQUIZOAPECTIVO

- presencia de un síndrome maníaco o depresivo que no resulta breve en comparación con la duración de la psicosis.
- presentan delirios o alucinaciones durante un mínimo de 2 semanas, sin coexistencia de síntomas del estado de ánimo importantes.

### TRASTORNO PSICOTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS

son trastornos con síntomas de psicosis provocados por sustancias de otro tipo

### CATATONIA

presencia de alteraciones motrices como la catalepsia (flexibilidad cética), el mutismo, la adopción de una postura y el negativismo. Puede asociarse con otros trastornos mentales

### TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

fase activa de la esquizofrenia (delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos), dura entre 1 y 6 meses