



Anan Villatoro Jiménez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Psiquiatría

Infografía

Quinto Semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre del 2024

ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRANSTORNOS PSICÓTICOS

Esquizofrenia

Paciente que cursa con alucinaciones o delirios por un mínimo de 6 meses

Se divide en 3 fases: prodrómica, activa y residual



Trastorno delirante

Se caracteriza por creencias fijas persistentes usualmente de situaciones que podrían presentarse en la vida real

P. ejm. erotománicas o celotípicas

Paranoia

Folie a deux

Trastorno psicótico breve

Paciente sufre de delirios, alucinaciones, discurso y comportamiento desorganizado, como mínimo un día pero menos de 1 mes



Trastorno esquizofreniforme

Se caracteriza por los mismos síntomas de la fase activa de la esquizofrenia (p.ej. delirios, alucinaciones, síntomas negativos, etc.), pero dura entre 1-6 meses.

Trastorno esquizoafectivo

Se caracteriza por mismos síntomas de la fase activa de la esquizofrenia más un síndrome maníaco o depresivo durante un lapso de 2 semanas




Trastorno psicótico inducido por sustancia/medicamentos

Pacientes con síntomas de psicosis provocados por sustancias psicoactivas o de otro tipo (p. ej., alucinógenos, cocaína).



Trastorno psicótico debido a otra afección médica

Se caracteriza por alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica (p. ej., epilepsia del lóbulo temporal, avitaminosis, meningitis).



Catatonia

Presencia de alteraciones motrices que se asocia a otros trastornos mentales u otra afección médica