



**Nombre del alumno:**

**Miguel Angel Calvo Vazquez**

**Nombre del profesor:**

**Dr. Romeo Antonio Molina Román**

**Nombre del trabajo: resumen**

**Materia: Clínica quirúrgica**

**Grado: 5°**

**Grupo: C**

# Hemorroides

## Definición

Las hemorroides son estructuras vasculares normales ubicadas en el canal que contribuyen a la continencia. Se consideran una patología cuando estas se agrandan, inflaman o prolapsan, causando síntomas.

## Etiología

- Aumento crónico de la presión intraabdominal
- Estrés repetido durante la defecación
- Disminución en la tonicidad de tejidos de soporte anal

## Factores de riesgo

- Embarazo
- Esfuerzo prolongado al defecar
- Envejecimiento
- Dieta pobre en fibra
- Obesidad
- Levantar objetos pesados

## Cuadro clínico

- Sangrado rectal indoloro
- Prolapso rectal
- Secreción mucosa
- Prurito o irritación perianal
- Dolor intenso

## Clasificación

**Grado 1:** Están agrandadas pero no prolapsan fuera del canal anal.

**Grado 2:** Prolapsan durante la defecación pero se reducen espontáneamente y se acompaña de sangrado.

**Grado 3:** Prolapsan durante la defecación o esfuerzo y requieren una reducción manual y suelen ser sintomático.

**Grado 4:** Prolapso permanente que no puede ser reducido, incluso manualmente.

## Tipos

**Externos:** con venas dilatadas debajo de la piel alrededor del ano. Causan picazón, dolor y malestar.

**Internos:** se localizan en la parte interna del ano, en el recto, aunque pueden proyectarse hacia fuera del ano.

**Mixta:** La hemorride puede proyectarse tanto interna y externa del ano.

**Prolapsada:** Forma más grave de hemorride interna, que ocurre cuando la hemorride sobresale del ano.

**Trombosada:** Cuando se forman coágulos dentro de la hemorride interna o externa, cuando incluyen

## Diagnostico

### Clinico

- Inspección perianal y examen rectal digital

### Diagnostico diferencial

- Descartar otras causas como sangrado rectal, fisuras anales, abscesos, polipos o neoplasias

### Anoscopia

Estudio de elección para las hemorroides internas, permitiendo observar sangrado o prolapso

### Colonoscopia o sigmoidoscopia

- indicado en pacientes mayores de 50 años

## Tratamiento

### Pomadas para hemorroides

Tienen acción vasoconstrictora analgesica y antiinflamatoria como proctyl o Proctosan

- Incremento en el consumo de fibra
- Uso topico de analgesicos y antiinflamatorios
- Laxantes osmoticos

## Quirurgico

- Ligadura con bandas elasticas
- Foto coagulación infrarroja
- Escleroterapia
- Hemorroidectomía
- Hemorroidopexia con engrapadora