



Luis Alberto Ballinas Ruiz

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Sistema nervioso central

Medicina Física y de Rehabilitación

PASIÓN POR EDUCAR

5° "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024.

- 1- Lesión del plexo braquial traumática
- 2- Parálisis braquial del recién nacido
- 3- Síndrome de Horner
- 4- Síndrome de Kumpke
- 5- Neuropatía braquial
- 6- Síndrome de Parsonage - Turner
- 7- Herniación discal lumbar
- 8- Tumores del plexo braquial
- 9- Síndromes de compresión
- 10- Plexopatía postquirúrgica.

Estramiento → Sobrecarga sin ruptura

Desgarro → Daño parcial o completo de las fibras nerviosas

Auición del plexo braquial → Más severa, ocurre cuando el nervio es separado o arrancado de la médula espinal


Lesion Plexo RN

<p>Erb</p> <p>Raíces Afectadas → C5, C6, C7</p> <p>Signo característico → Propio de Muesero</p> <p>N. afectados → Subescapular, Axilar, Radial</p>	<p>Kumpke</p> <p>C8 a T1</p> <p>"Garra"</p> <p>Mediario axilar</p>
---	---


Tx → Conservador / Ox / Antiflogísticos / Terapia física

Dx → HC, EF, RM, USG, Electromiografía, F. conducción nerviosa

Antecedente → Distocia



A. Axila: plexo braquial



C. Inervación sensitiva del plexo braquial