


INFOGRAFIA

PSIQUIATRIA



Nombre del alumnos:

• Carlos Ulises Gordillo Cancino

Grado: 5º **Grupo:** D

Docente:

Dr. Christian Jonathan Aguilar Ocampo



TRANSTORNO DELIRANTE



DEFINICION

Trastorno en el que la manifestación principal o única es un delirio no extravagante, fijo e inquebrantable.



ETIOLOGIA

1. Causas genéticas
2. Causas biológicas
3. Causas psicosociales

EPIDEMIOLOGIA

- Representa el 1-2% de todas las hospitalizaciones.
- Edad media de inicio (40 años) aunque el rango es de (18 a 90 años o mas).
- Ligerio dominio en las mujeres.
- Mayor probabilidad en hombres.

PRONOSTICO

- 50% de los pacientes han demostrado recuperación en seguimientos de largo plazo.
- 20% de reducción de los síntomas.
- Existe un 30% donde no demuestran cambio alguno.



CUADRO CLINICO

- Uno o mas delirios que permanecen por lo menos 1 mes.
- No hay presencia de esquizofrenia.
- Episodios anímicos
- Delirios no secundarios a afeccion medica o consumo de drogas.

FACTORES DE RIESGO

- Edad avanzada
- Antecedentes de discapacidad sensorial o aislamiento familiares
- Aislamiento social
- Rasgos de personalidad
- Migración reciente.

TRATAMIENTO



- **Hospitalización**
(Necesaria cuando el paciente es incapaz de controlar sus impulsos).
- **Farmacológico**
(Antipsicótico, antipsicóticos orales).
 - ISRS
 - **Psicologico**
(La terapia individual parece ser más eficaz, que las terapias orientadas a la introspección, apoyo, etc).



BIBLIOGRAFIA:

Kaplan & Sadock. *Bolsillo de PSQUIATRIA CLÍNICA. 6ª Edicion.*