

COMITAN DE DOMINGUEZ
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

MEDICINA FORENSE

ANDY JANETH PEREZ DIAZ
DRA. KARLA SOFIA LOPEZ GUTIERREZ
5 SEMESTRE GRUPO D
2 PARCIAL
SIGNOS CADAVERICOS TEMPRANOS Y TARDIOS

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, A 12 DE
OCTUBRE DEL 2024

ENFRIAMIENTO (ALGOR MORTIS)




tendencia a la nivelación de la temperatura del cadáver con la del medio ambiente. se manifiesta en:

- cara
 - manos
 - pies
- a las dos horas

mas tardío en:

- abdomen
- cuello
- Axilas
- visceras



DESHIDRATACION

PERDIDA DE LIQUIDO QUE POR FENOMENOS FISICOS DE EVAPORACION, CONDUCCION, CONVECCION E IRRADIACION SUFRE EL CADAVER Y QUE SE TRADUCE EN PERDIDAS DE PESO Y MODIFICACIONES CUTANEAS, MUCOSAS

- signo de stenor-Lois
- signo de SOMER



lo acelera:

- niñez
- senilidad
- desnudes
- caquexia
- agonía
- hemorragia severa

lo retarda:

- nurna salud
- obesidad
- vestimenta
- enf. febril
- intoxicaciones
- ambiente caluroso

RIGIDEZ (RIGOR MORTIS)

endurecimiento de las fibras musculares y la retracción de los mismos en el cadáver aparece de arriba hacia abajo y desaparece en el mismo orden coincidiendo con el inicio de la putrefacción.

REGLA DE NIDERKORN:

- rigidez precoz (ant. 3hr)
- rigidez normal (3-6 hr)
- rigidez tardía (6-9hr)
- rigidez muy tardía (desp. 9 hr)



TEMPRANOS signos cadavericos TARDIOS

PUTREFACCION

descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias. se divide en cuatro fases:

- colorativo o cromático
- enfisematoso
- colicuvativo o licuefacción
- reducción esquelética




FLORA Y FAUNA CADAVERICA

conjunto de insectos que se suceden con regularidad cronológica en un cadáver humano desde el momento de la muerte hasta su destrucción.

consta de cuatro periodos:

1. sarcófago
2. dermestariano
3. silfiano
4. acariano



SAPONIFICACION

transformación de las grasas en reacción con el oxígeno que conduce en condiciones de humedad a la formación de una coraza grasa, untosa y viscosa.



CORIFICACION

transformación del cadáver de aspecto de cuerpo recién curtido de color gris amarillento y resistente al corte.

- reducción de vísceras, músculos y tejidos subcutáneos.



MOMIFICACION

deseccación del cadáver por evaporación rápida del agua tisular.

- comienzo (cara, manos, pies)
- pérdida de peso
- posmortem (1-12 meses)

