



**Mi Universidad**

**Mapas  
conceptuales**

Nombre del alumno:

Diana Rocío Gómez López.

Nombre del profesor:

Dr. Erick Antonio Flores Gutiérrez

Nombre del tema:

Materia:


Medicina Física y Rehabilitación


:


Medicina humana.


Semestre: 5to.


*Grupo: D*











**síndrome de guillén barre**

definición

polirraquimiopatía aguda autoinmune que afecta a nervios periféricos y nervios raquídeos

epidemiología

1er causa de parálisis flácida  
incidencia 0.6-0.4 cada 100.000  
picos de edad:  
adulto joven (14-24)  
ancianos ( +60 años- 74 )  
Hombres  
mujeres

etiología

- anticuerpos IgG anti-glicosidos anti-GM1
- Secundario a una infección
  - 1-campylobacter jejuni
  - 2-citomegalovirus
  - 3-H influenzae

fisiopatología

asociado a mimetismo molecular  
similítus a peptidos virales o por infección  
degradan las bandas de mielina

tipos

- polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria desmielinizante PIDA  
CGHUN- 80%  
buen pronóstico
- síndrome de miller fisher  
virus de epsten barr  
1-oftalmoplejía  
2-arreflexia  
3-abaxia  
parálisis facial bilateral
- neuropatía axonal motora aguda NAMA  
neuropatía sensitivo motor  
mal pronóstico

manifestaciones clínicas

- parestesias
- debilidad de miembros inferiores
- dismesias
- dolor lumbar
- mialgias
- arritmias cardiacas
- afección del nervio VII craneal
- diaforesis

factores de riesgo

- virus de influenza
- bacteria
- hepatitis
- virus VIH
- linfoma hodking
- poliomielitis

diagnóstico

- clínico  
escala de asbury y cornblath
- 1er semana  
electromiografía
- 2da semana  
LCR  
aumento de prpteines  
disociación albuminoproteica

tratamiento

- 1ra elección  
inmunoglobulinaIV 2gr/KG primeros 5 días
- 2da elección  
plasmaferesis de acuerdo a escala de hughes
- 3ra elección  
anticoagulante enoxaparina

escala de HUGHES

- 0- sin discapacidad
- 1- signos y síntomas menores, capacidad de correr
- 2- capaz de caminar 10 metros sin ayuda, no puede correr
- 3- capaz de caminar 10metros con ayuda
- 4- confinado a una cama o silla sin poder caminar
- 5- requiere asistencia respiratoria
- 6- muerte

