

Vacuna	Enfermedad que proviene	Edad
Td	Tetanos, difteria	Apartir de los 15 años de edad y cada 10 años
SR	Sarampon, rubeola.	Adolescentes de $\geq 11$ años de edad que no cuenten con dos dosis de SRP o SR.
Antihepatitis B	Hepatitis B	Adolescentes de 11 años de edad que no cuenten con el antecedente vacunal
VPH	Infeccion por virus del papiloma humano.	Niñas en 5 grado de primaria o de 11 años de edad no escolarizadas
TDPA	Tetanos, difteria, tos ferrea.	Embarazadas de la semana 20-32 de gestacion
Antiinfluenza	Influenza	Poblacion de 19-59 años de edad considerada con factores de riesgo. Toda poblacion apartir de los 60 años
Antineumococica Polivalente	Infecciones por neumococo	Poblacion de 60-64 años con factores de riesgo. Toda la poblacion de 65 años de edad.

*[Handwritten signature]*

# Esquema Nacional de Vacunación

Vacuna	Enfermedad que previene	Dosis	Edad y Frecuencia	Vía y sitio de administración	Contraindicaciones
Adaptado B	Difteria, tétanos, Tétanos Poliomielitis e infecciones por H. influenzae b	Primera (0.5 ml)	2 meses	Intramuscular en el tercio medio de la corva.	Fiebre de 38.5°C o más
		Segunda (0.5 ml)	4 meses	antrolateral externo del muslo derecho.	Hipersensibilidad a componentes de la vacuna
		Tercera (0.5 ml)	6 meses	10/12 cm del musculo izquierdo.	Historia personal de convulsiones u otros eventos agudos.
DPT	Difteria, tétanos, Ferme y Tétanos.	Primera (1.5 y 2 ml)	2 meses	Intramuscular profunda en la región deltoidea del brazo izquierdo.	Fiebre de 38.5°C o más
		Segunda (1.3 y 2 ml)	4 meses	ORCI	Con antecedentes de meningitis infecciosa o pastosintesis ineluctable, incluyendo malformación congénita hipersensibilidad.
		Tercera (1.5 y 2 ml)	6 meses		Fiebre de 38.5°C o más
Rotavirus	Diarrea por rotavirus.	Primera (0.5 ml)	2 meses	Intramuscular en la corva externa del lado lateral del muslo derecho.	Fiebre de 38.5°C o más
		Segunda (0.5 ml)	4 meses		Hipersensibilidad a componentes de la vacuna.
		Tercera (0.5 ml)	6 meses		Lactantes menores de 6 meses
Vesiculocita Congénita	Infecciones por herpes zoster	Primera (0.25 ml)	6 meses	Intramuscular en el tercio medio de la corva antrolateral externa del musculo izquierdo.	Reacción de hipersensibilidad incluyendo toxiérgica al huevo o a una dosis previa de la vacuna.
		Segunda (0.25 ml)	7 meses		Fiebre mayor a 38.5°C
		Tercera (0.25 ml)	Actual hasta los 35 meses		Reacción de hipersensibilidad a componentes de la vacuna.
Influenza	Influenza	Primera (0.5 ml)	Actual o próximos de 6 a 9 años de riesgo.	Intramuscular en el musculo deltoideo izquierdo.	Fiebre mayor a 38.5°C
		Segunda (0.5 ml)	Actual o próximos de 6 a 9 años de riesgo.		Reacción de hipersensibilidad a componentes de la vacuna.
		Tercera (0.5 ml)	Actual o próximos de 6 a 9 años de riesgo.		Reacción de hipersensibilidad a componentes de la vacuna.

Vacuna	Enfermedad que previene	Dosis	Edad y Frecuencia	Vía y Sitio de Administración	Contraindicaciones
SRP	Sarampión, Rubéola y Paperitis.	Dosis (0.5 ml) Refuerzo (0.5 ml)	1 año 6 años	Subcutánea en el área superior externa del brazo izquierdo	Fiebre de 38.5°C o más Antecedentes de reacción anafiláctica o los antecedentes de hinchazón neuromuscular. Tuberculosis sintx.
Sabin	Poliomielitis.	Adicionales 1ª y 2ª dosis Seroso vacuola de Sabin	De 6 meses a 4 años, 11 meses.	Oral 2 gotas (0.1 ml)	Fiebre mayor a 38.5°C Inmunodeficiencia o con tratamiento inmunosupresor Reacciones alérgicas a dosis anteriores.
SR	Sarampión y Rubéola	Adicionales (0.5 ml).		Subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo	Historia de sibilidad a los componentes de la vacuna. Historia de fiebre de 38°C Reacción con inmunodeficiencia y ex. Inmuno supresor. Antecedentes de convulsiones y otros y dependencias y cuadros convulsivos sin tratamiento

JEAN