



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL PROFESOR:

Arely Alejandra Aguilar

NOMBRE DEL ALUMNO:

Fabián Aguilar Vaaquez

MATERIA:

Salud publica

TAREA:

Cuadro

GRUPO:

1:D

Nombre de la Vacuna	Contra qué antígenos tiene acción	Número de dosis	Vía de administración	Contraindicaciones
BCG	Tuberculosis	Una dosis (al nacer)	Intradérmica (región deltoidea)	No se recomienda en bebés con inmunodeficiencias congénitas, VIH, o bajo peso extremo (<2000g).
Hepatitis B	Hepatitis B	Tres dosis (al nacer, 2 y 6 meses)	Intramuscular (muslo)	Reacciones graves previas a esta vacuna; alergia a alguno de sus componentes.
Hexavalente celular	Difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo B	Cuatro dosis (2, 4, 6 y 18 meses)	Intramuscular (muslo)	Antecedente de reacción alérgica grave a dosis previas o a alguno de sus componentes; encefalopatía sin causa identificada dentro de 7 días posteriores.
DPT	Difteria, tos ferina, tétanos	Refuerzo (4 años)	Intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a una dosis previa; encefalopatía sin causa identificada dentro de 7 días posteriores; convulsiones no controladas.
Rotavirus	Rotavirus (previene gastroenteritis grave)	Dos o tres dosis (2 y 4 meses; en algunos casos, 6 meses)	Oral	Malformaciones intestinales graves (ej. intususcepción), inmunodeficiencias graves (ej. VIH); historia de intususcepción previa.
Neumocócica conjugada	Neumococo (previene infecciones como neumonía, meningitis y sepsis)	Tres dosis (2, 4 y 12 meses)	Intramuscular (muslo o brazo)	Alergia a una dosis previa o a alguno de sus componentes.
Influenza	Influenza estacional	Anual (a partir de los 6 meses)	Intramuscular (brazo)	Alergia al huevo (según la vacuna), reacción alérgica grave a una dosis previa; fiebre alta en el momento de la vacunación; enfermedad moderada o grave aguda.
SRP (triple viral)	Sarampión, rubéola, parotiditis	Dos dosis (1 año y 6 años)	Subcutánea (brazo)	Embarazo, inmunodeficiencias graves, alergia a dosis previas o componentes (ej. neomicina, gelatina).
Td (tétanos-difteria)	Tétanos y difteria	Refuerzos cada 10 años	Intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a dosis anteriores, enfermedad febril aguda moderada o grave en el momento de vacunación.
VPH	Virus del papiloma humano	Dos dosis (9 a 11 años)	Intramuscular (brazo)	Embarazo, reacción alérgica grave a dosis anteriores o componentes; fiebre alta al momento de la vacunación; enfermedad grave o moderada.
Doble viral (SR)	Sarampión y rubéola	Refuerzo en adultos	Subcutánea (brazo)	Embarazo, inmunodeficiencia grave, alergia a neomicina o gelatina; enfermedad febril aguda en el momento de la vacunación.