



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL PROFESOR:

ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO

NOMBRE DEL ALUMNO:

JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ

MATERIA:

SALUD PUBLICA

TAREA:

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION

GRUPO:

1:D

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

VACUNA	CONTRA QUÉ ANTÍGENOS ACCIÓN	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	CONTRAINDICACIONES
BCG	TUBERCULOSIS	UNA DOSIS (AL NACER)	INTRADÉRMICA (REGIÓN DELTOIDEA)	NO SE RECOMIENDA EN BEBÉS CON INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS, VIH, O BAJO PESO EXTREMO (MENOS DE 2000G).
HEPATITIS B	HEPATITIS B	TRES DOSIS (AL NACER, 2 Y 6 MESES)	INTRAMUSCULAR (TERCIO MEDIO DEL MUSLO IZQUIERDO)	REACCIONES GRAVES PREVIAS A ESTA VACUNA; ALERGIA A ALGUNO DE SUS COMPONENTES.
HEXAVALENTE CELLULAR	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	CUATRO DOSIS (2, 4, 6 Y 18 MESES)	INTRAMUSCULAR (TERCIO MEDIO DEL MUSLO IZQUIERDO)	ANTECEDENTE DE REACCIÓN ALÉRGICA ENCEFALOPATÍA SIN CAUSA IDENTIFICADA DENTRO DE 7 DÍAS POSTERIORES.
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS	REFUERZO (4 AÑOS)	(BRAZO IZQUIERDO)	REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE A UNA DOSIS PREVIA; ENCEFALOPATÍA SIN CAUSA IDENTIFICADA DENTRO DE 7 DÍAS POSTERIORES; CONVULSIONES NO CONTROLADAS.
ROTAVIRUS	ROTAVIRUS (PREVIENE GASTROENTERITIS GRAVE)	DOS O TRES DOSIS (2 Y 4 MESES; EN ALGUNOS CASOS, 6 MESES)	ORAL	MALFORMACIONES INTESTINALES GRAVES INMUNODEFICIENCIAS GRAVES (VIH), HISTORIA DE INTUSUSCEPCIÓN PREVIA.
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	NEUMOCOCO (PREVIENE INFECCIONES COMO NEUMONÍA, MENINGITIS Y SEPSIS)	TRES DOSIS (2, 4 Y 12 MESES)	INTRAMUSCULAR (TERCIO MEDIO DEL MUSLO IZQUIERDO)	ALERGIA A UNA DOSIS PREVIA O A ALGUNO DE SUS COMPONENTES.
INFLUENZA	INFLUENZA ESTACIONAL	ANUAL (A PARTIR DE LOS 6 MESES)	(BRAZO)	REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE A UNA DOSIS PREVIA; FIEBRE ALTA EN EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN; ENFERMEDAD MODERADA O GRAVE AGUDA.
SRP (TRIPLE VIRAL)	SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS	DOS DOSIS (1 AÑO Y 6 AÑOS)	SUBCUTÁNEA (BRAZO)	EMBARAZO, INMUNODEFICIENCIAS GRAVES, ALERGIA A DOSIS PREVIAS O COMPONENTES.
HEPATITIS A	HEPATITIS A	DOS DOSIS (12 Y 18 MESES)	INTRAMUSCULAR (MUSLO O BRAZO)	ALERGIA A UNA DOSIS PREVIA O COMPONENTES DE LA VACUNA; ENFERMEDAD AGUDA GRAVE O MODERADA AL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN.
TD (TÉTANOS-DIFTERIA)	TÉTANOS Y DIFTERIA	REFUERZOS CADA 10 AÑOS	INTRAMUSCULAR (BRAZO)	REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE A DOSIS ANTERIORES, ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA MODERADA O GRAVE EN EL MOMENTO DE VACUNACIÓN.
VPH	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	DOS DOSIS (9 A 11 AÑOS)	INTRAMUSCULAR (BRAZO)	EMBARAZO, REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE A DOSIS ANTERIORES O COMPONENTES; FIEBRE ALTA AL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN; ENFERMEDAD GRAVE O MODERADA.
DOBLE VIRAL (SR)	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	REFUERZO EN ADULTOS	SUBCUTÁNEA (BRAZO)	EMBARAZO, INMUNODEFICIENCIA GRAVE, ALERGIA A NEOMICINA O GELATINA; ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA EN EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN.