



NOMBRE DE LA MATERIA:

SALUD PUBLICA

ESQUEMA DE VACUNACION

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

“MEDICINA HUMANA”

Luis Abraham Zamudio Martinez

1 “D”

ESQUEMA DE VACUNACION

Nombre de la Vacuna	Contra qué antígenos tiene acción	Número de dosis	Vía de administración	Contraindicaciones
BCG	Tuberculosis	1 dosis (al nacer)	Intradérmica (región deltoidea)	No se puede colocar en bebés con inmunodeficiencias congénitas, VIH, o bajo peso extremo (<2000g).
Hepatitis B	Hepatitis B	3 dosis (al nacer, 2 y 6 meses)	Intramuscular (muslo)	Reacciones graves previas a esta vacuna; alergia a alguno de sus componentes.
Hexavalente celular.	Difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo B	4 dosis (2, 4, 6 y 18 meses)	Intramuscular (muslo)	Antecedente de reacción alérgica grave a dosis previas o a alguno de sus componentes; encefalopatía sin causa identificada dentro de 7 días posteriores.
DPT	Difteria, tos ferina, tétanos	Refuerzo (4 años)	Intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a una dosis previa; encefalopatía sin causa identificada dentro de 7 días posteriores; convulsiones no controladas.
Rotavirus	Rotavirus (previene gastroenteritis grave)	2 o 3 dosis (2 y 4 meses; en algunos casos, 6 meses)	Oral	Malformaciones intestinales graves (ej. intususcepción), inmunodeficiencias graves (ej. VIH); historia de intususcepción previa.
Neumocócica conjugada	Neumococo (previene infecciones como neumonía, meningitis y sepsis)	3 dosis (2, 4 y 12 meses)	Intramuscular (muslo o brazo)	Alergia a una dosis previa o a alguno de sus componentes.
Influenza	Influenza estacional	Anual cada año (a partir de los 6 meses)	Intramuscular (brazo)	Alergia al huevo (según la vacuna), reacción alérgica grave a una dosis previa; fiebre alta en el momento de la vacunación; enfermedad moderada o grave aguda.
SRP (triple viral)	Sarampión, rubéola, parotiditis	2 dosis (1 año y 6 años)	Subcutánea (brazo)	Embarazo, inmunodeficiencias graves, alergia a dosis previas o componentes (ej. neomicina, gelatina).
Td (tétanos-difteria)	Tétanos y difteria	Refuerzos cada 10 años	Intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a dosis anteriores, enfermedad febril aguda moderada o grave en el momento de vacunación.
VPH	Virus del papiloma humano	2 dosis (9 a 11 años)	Intramuscular (brazo)	Embarazo, reacción alérgica grave a dosis anteriores o componentes; fiebre alta al momento de la vacunación; enfermedad grave o moderada.
Doble viral (SR)	Sarampión y rubéola	Refuerzo en adultos	Subcutánea (brazo)	Embarazo, inmunodeficiencia grave, alergia a neomicina o gelatina; enfermedad febril aguda en el momento de la vacunación.