

salud publica



Universidad del sureste

Medicina humana

Narvaez Villar Diana Fabiola

1-D

Dr. Aguilar Velasco Arely Alejandra

Nombre de la vacuna	Contra que antígenos tiene acción	Cuántas dosis se necesitan	Vía de administración	contraindicaciones	Dosis en ml
BCG	tuberculosis	Una sola dosis (al nacimiento)	Intradérmica (región deltoidea)	No recomendado en bebés con: bajo peso (menor de 200gr) VIH, inmunodeficiencias congénitas	0.1 ml
Hepatitis B	Hepatitis B	Tres dosis Al nacer 2 meses 6 meses	Intramuscular (muslo)	Reacciones graves previas a esta vacuna Alergia a algún componente de esta	0.5 ml
Hexavalente celular	Difteria Tos ferina Tetanos Poliomelitis Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis tipo B	Cuatro dosis 2, 4 6 y 18 meses	Intramuscular (muslo en lactantes y músculo deltoideo en niños)	Si la persona ha tenido reacción alérgica a algún componente de la vacuna Si ha tenido encefalopatía de causa desconocida dentro de 7 días posteriores a la administración de esta	0.5 ml
DPT (triple bacteriana)	Difteria Tos ferina tetanos	Refuerzo Entre 4 y 6 años	Intramuscular (brazo)	Si el paciente tiene una enfermedad grave, con o sin fiebre Si tiene temperatura mayor a 38°C Si tiene enfermedades infecciosas o alérgicas, o si tiene cuadros convulsivos	0.5

Rotavirus	Rotavirus (previene gastroenteritis grave)	RV5: 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses O RV1; 2 dosis a los 2 y 4 meses	Oral (gotas)	Niños mayores de 8 meses de edad Si el bebe tiene una reacción alérgica (anafilaxia) Si tiene fiebre mayor a 38.5°C, diarrea y vomito Quien tenga antecedente de alguna enfermedad crónica de los intestinos	1.5ml o 2 ml depende de la vacuna que se utilice
Neumocócica conjugada	Neumococo (previene infecciones como neumonía, meningitis y sepsis)	Cuatro dosis a los 2, 4, 6 y de 12 a 15 meses	Intramuscular bebés en el musculo vasto y en niños mayores y adultos musculo deltoides	No se debe vacunar si ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a la vacuna o a alguno de sus componentes Se debe posponer si hay alguna infección	0.5 ml
influenza	Influenza estacional	Anual a partir de los 6 meses	intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a una dosis previa, fiebre alta en el momento de la vacunación, enfermedades graves o agudas.	0.5 ml
SRP (triple viral)	Sarampión Rubeola parotiditis	Dos dosis 1 año y 6 años	Subcutánea (brazo)	No se utiliza en embarazos, inmunodeficiencias graves, alergias a dosis previas o componentes de esta (ej. Neomicina)	0.5 ml
Hepatitis A	Hepatitis A	Primera dosis entre los 12 y 23	Intramuscular (muslo o brazo)		0.5 ml

		meses y la segunda dosis entre los 6 y 18 meses después de la primera			
TD (tetanos y difteria)	Tetanos y difteria	Se aplica a niños mayores de 7 años, adolescentes y adultos con un refuerzo cada 10 años	Intramuscular (brazo o muslo)	Si se a tenido reacción alérgica a una dosis de esta Si se ha tenido síndrome de Guillan Barre Si se tiene una enfermedad grave con o sin fiebre	0.5
VPH	Virus del papiloma humano	Dos dosis 9 y 11 años	Intramuscular (brazo)	Embarazo Reacción alérgica grave o dosis anteriores o componentes. Fiebre alta al momento de la vacunación, Enfermedad grave o moderada	0.5ml
Doble viral (SR)	Sarampión y rubeola	Refuerzo en adultos	Subcutánea (brazo izquierdo)	Si la persona ha tenido una reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna Si la persona está embarazada Si la persona tiene una enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre	0.5 ml

