



ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

Materia:
Salud pública

Profesora:
Arely Alejandra Aguilar Velasco

Alumna:
Zaira Rubí Rodríguez Sánchez

Semestre y Grupo:
1- D

Esquema básico de vacunación de niñas y niños de 0 a 9 años de edad

VACONA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	PATÓGENO	DO SIS	EDAD y FRECUENCIA	VIA y SITIO DE ADMINISTRACION	CONTRAINDICACIONES
BCG (Bacilo Calmette - Guérin)	Tuberculosis meningéa y miliar	Bacteria Mycobacterium bovis Tuberculosis Bacilo avicida Aidb alcohol resistente (BAAR)	Única (0.1ml)	Al nacer	Intradérmica en la cara externa de la unión de tercio medio del brazo derecho. Ángulo: 15°	• Niños con > 2kg • Inmunodeficiencias • Tx con corticoides • Fiebre de 38.5°C • Pacientes con SIDA • Pacientes embarazadas
Hepatitis B	Hepatitis B	Virus de la hepatitis B (VHB)	• Primera (0.5ml) • Segunda (0.5ml) • Tercera (0.5ml)	• 2 meses • 4 meses • 6 meses	Intramuscular en la cara externa del vasto lateral del muslo izquierdo.	• Fiebre de 38.5°C • Hipersensibilidad a componentes de la vacuna
Pentavalente Acelsular DP a T + VP1 + Hib. + Hib. J Hexavalente	- Difteria - Tos ferina - Tetanos - Poliomelitis - Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b Bacteria	Difteria: Bacteria: Corynebacterium diphteriac Tos ferina: Bacteria: Bordetella pertossis Tetanos: Bacteria: Clostridium tetani Poliomelitis: Virus poliovirus	• Primera (0.5ml) • Segunda (0.5ml) • Tercera (0.5ml) • Refuerzo (0.5ml)	• 2 meses • 4 meses • 6 meses • 18 meses	Intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho.	• Fiebre de 38.5°C o más. • Hipersensibilidad a componentes de la vacuna. • Historia personal de convulsiones u otros eventos graves.

DPT

- Difteria,
- Tos ferina,
- Tetanos

Bacterias:

- Corynebacterium diphtheriae
- Bordetella pertussis
- Clostridium tetani

Reforzo

0.5 ml

4 años

Intramuscular profunda en la región del hoides del brazo izquierdo

- Reacciones anafilácticas y encefalopatías superiores. (PRES)
- Presencia de crisis convulsivas en los últimos 30 meses.

Síndrome de encefalopatía posterior reversible

Rotavirus

Diarrea por rotavirus

Virus:

Rotavirus (RAB) de la familia Reoviridae.

Primera (1.5 y 2 ml)

Segunda (1.5 y 2 ml)

Tercera (1.5 y 2 ml)

2 meses

4 meses

6 meses

Oral

- Con antecedentes de infección intestinal o gastro-intestinal crónica, infección malformación congénita.
- Hipersensibilidad

Neumococo conjugada

Infecciones por neumococo

Bacterias:

Streptococo pneumoniae

Primera (0.5 ml)

Segunda (0.5 ml)

Tercera (0.5 ml)

2 meses

4 meses

12 meses

Intramuscular

en la cara externa del vasto lateral del muslo derecho.

- Febre de 38.5° más
- Hipersensibilidad a componentes de la vacuna.

Infecciones del oído

• Sinusitis

• Neumonía

• Sepsis

• Meningitis

<p>Influenza</p> <p>Influenza</p>	<p>El virus de la influenza A y B</p> <p>↓</p> <p>potenciados a la familia Orthomyxoviridae.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primera (0.25 ml) • Segunda (0.25 ml) • Revacunación (0.25 ml) • Revacunación (0.25 ml) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 meses • 7 meses • Anual hasta los 35 meses • Anual a niños de 5 a 9 años con factores de riesgo 	<p>Intramuscular en el tercio medio de la cara anterior lateral externa del muslo izquierdo</p> <p>Intramuscular en el musculo deltoides izquierdo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lactantes menores de 6 meses • Reacción de hipersensibilidad incluyendo la anafiláctica al huevo o a una dosis previa de la vacuna • Fiebre mayor o igual a 38.5°C • Pacientes con Síndrome de Guillain Barré
<p>SRP</p> <p>Vacuna Triple Viral</p>	<p>- Sarampion</p> <p>- Rubéola</p> <p>- Paratiditis</p> <p>↓</p> <p>virus paramixovirus</p>	<p>Virus:</p> <p>Sarampion</p> <p>Morbillivirus de la familia Paramixoviridae</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primera (0.5 ml) • Segunda • Refuerzo (0.5 ml) • 1 año • 18 meses • 6 años 	<p>Subcutanea en el área superior externa del triceps del brazo izquierdo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre de 38.5°C o más. • Antecedentes de reacción anafiláctica a las proteínas de huevo y neumonías. • Tuberculosis sin tx.
<p>Sabin</p>	<p>Poliomielitis</p>	<p>Adicionales 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud</p>	<p>De 6 meses a 4 años 11 meses</p>	<p>Oral 2 gotas (0.1ml)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre mayor a 38.5°C • Inmunodeficiencias o con tratamiento inmunosupresor • Reacciones alérgicas a dosis anteriores

SR

Vacuna

Doble viral

- Sarampión

- Rubéola

- Morbillivirias
- Viras de la familia *Togaviridae* y el género *Rubrivirias*

Adicionales (0.5ml)

10 años

Subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo

- Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna.
- Hipertermia mayor de 38°C
- Personas con inmunodeficiencias y tx inmunosupresor
- Padecimientos neurológicos activos o degenerativos y cuadros convulsivos sin tratamiento.

Variante