



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina humana

Sofia Valentina Pinto Albores 1D

SALUD PÚBLICA

DRA. ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO

TABLA DE VACUNACIÓN

TABLA DE VACUNACIÓN

nombre de la vacuna	num de dosis	via de administración	contraindicaciones	dosis en ml
BCG	UNA SOLA DOSIS (AL NACIMIENTO)	ORAL (GOTAS)	NO RECOMENDADOS EN BEBES CON BAJO PESO	0.1ML
HEPATITIS B	AL NACER 2 MESES 6 MESES	INTRAMUSCULAR	ALERGIA A ALGUN COMPONENTE DE ESTA	0.5ML
HEXAVALENTE CELULAR	4 DOSIS 2,4,6 Y 18 MESES	INTRAMUSCULAR	REACCION ALERGICA A COMPONENTES DE LA VACUNA	0.5ML
DTP (TRIPLE BACTERIANA)	REFUERZO ENTRE 4 Y 6 AÑOS	SUBCUTANEA	SI PADECE DE UNA ENFERMEDAD GRAVE	0.5
ROTAVIRUS	RV5 3 DOSIS A 2,4 Y 6 MESES	INTRAMUCULAR (BRAZO O MUSLO)	ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD CRONICA EN LOS INTESTINOS	0.50 2 ML DEPENDIENTE

NEUMOCOXICA CONJUGADA	4 DOSIS A LOS 2,4,6 Y ED 12 A 15 MESES	INTRAMUSCULAR	NO APLICAR SI HA TENIDO ALERGIA POTENCIALMENTE MORTAL A LA ACUNA	0.5ML
INFLUENZA	ANUAL A PARTIR DE LOS 6 MESES	INTRAMUSCULAR	REACCION ALERGICA A UNA DOSIS PREVIA	0.5ML
SRP (TRIPLE VIRAL)	DOS DOSIS 1 AÑO Y 6 AÑOS	SUBCUTANEA	NO SE UTILIZA EN EMBARAZOS	0.5ML
HEPATITIS A	PRIMERA DOSIS ENTRE OS 12 Y 23 MESES	INTRAMUCULAR (BRAZO O MUSLO)		0.5ML
TD (TETANOS Y DIFTERIA)	NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON UN REFUERZO CADA 10 AÑOS	INTRAMUSCULAR (BRAZO O MUSLO)	SI SE TIENE ENFERMEDAD GRAVE O ALERGICA CON O SIN FIEBRE	0.5
VPH	2 DOSIS 9 Y 11 AÑOS	INTRAMUSCULAR	FIEBRE ALTA A LA HORA DE VACUNACION	0.5ML
DOBLE VIRAL (SR)	REFUERZO EN ADULTOS	SUBCUTANEA (BRAZO IZQUIERDO)	SI LA PERSONA ESTA EMBARAZADA	0.5ML