

UDS CAMPUS COMITÁN

MATERIA: SALUD PUBLICA

TAREA: ESQUEMA DE VACUNACIÓN

ALUMNA: MARIA FLOR LÓPEZ RUIZ

DOCENTE: AGUILAR VELASCO ARELY ALEJANDRA

CARRERA: MEDICINA HUMANA

GRUPO: 1-° D

FECHA: 05/NOVIEMBRE/2024





ESQUEMA DE VACUNACION

NOMBRE DE LA VACUNA	PATÓGENO	EDAD	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	SITIO DE APLICACIÓN	DOSIS	REFUERZO	CONTRADICCIONES	TIPO DE VACUNA
BCG	TUBERCULOSIS MENINGITIS Y MILIAR	NACIMIENTO	INTRADÉRMICA DE 10 A 15°	REGIÓN DELTOIDEA DE BRAZO DERECHO	DOSIS ÚNICA DE 0.1ML	DOSIS ÚNICA	-MUJERES EMBARAZADAS -NIÑOS CON PESO MENOS DE 2K	BACTERIAS VIVAS ATENUADA
HEPATITIS B	HEPATITIS B	AL NACIMIENTO	INTRAMUSCULAR 90°	TERCIO MEDIO DE LA CARA ANTEROLATER AL EXTERNA DEL MUSLO IZQUIERDO	0.5ML	SE APLICA 3 VECES: NACIMIENTO, LA SEGUNDA UN MES DESPUÉS Y LA TERCERA 6 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA	ALERGIAS AL TIMEROSOL FIEBRE	VIRUS INACTIVO (HBSAG)
HEXAVALENTE	DIFTERIA TOS FERIA TÉTANOS POLIOMIELITIS INFLUENZA TIPO B HEPATITIS B	2, 4, Y 6 MESES 18 MESES DE REFUERZO	INTRAMUSCULAR 90°	EN EL TERCIO MEDIO DE LA CARA ANTEROLATER AL EXTERNA DEL MUSLO DERECHO	0.5ML	1: 2 MESES 2DA: 1 O2 MESES DESPUÉS DE LA 1RA 3RA: 1º 2 MESES DESPUÉS DE LA 2DA 4TA: 6 O12 MESES DESPUÉS DE LA 3RA	MENORES DE 6 SEMANAS -ANTECEDENTES DE DESMAYO -FIEBRE	VIRUS Y BACTERIAS INACTIVOS



DPT	TOS FERINA TÉTANOS POLIOMIELITIS VHB	4 AÑOS (REFUERZO)	INTRAMUSCULAR 90°	REGIÓN DELTOIDEA DEL BRAZO IZQUIERDO	0.5ML	ES UNA VACUNA DE REFUERZO	MAYORES DE 6 AÑOS CON 11 MESES REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE	VACUNA INACTIVA
ROTAVIRUS	ROTAVIRUS GASTROENTERITIS	2 MESES 6 MESES	VÍA ORAL	COLOCANDO GOTAS EN LA BOCA DEL BEBE	0.5ML	PENTEVALENTE:3 DOSIS 2, 4, 6MESES MONOVALENTE: 2 DOSIS 2 Y 4 MESES	NO EN LACTANTES GASTROENTERITIS	VACUNA ATENUADO
INFLUENZA	VIRUS DE LA INFLUENZA	6 MESES 7 MESES	VÍA INTRAMUSCULAR	MENOR DE 18 MESES EN EL MUSLO IZQUIERDO MAYORES DE 18 MESES EN EL BRAZO IZQUIERDO	0.5ML	UNA DOSIS ANUAL (REFUERZO)	MENOR DE 6 MESES EN EMBARAZO ENFERMEDADES FEBRILES SEVERA	VACUNA INACTIVA
SRP	SARAMPIÓN RUBEOLA PAROTIDITIS	12 MESES	SUBCUTÁNEA INTRAMUSCULAR	BRAZO IZQUIERDO	0.5ML	72MESES (6 AÑOS)	CÁNCER SIDA	VACUNA ACTIVA
NEUMOCOCO CONJUGADA	NEUMONÍA MENINGITIS OTITIS MEDIA SINUSITIS	2 MESES 4 MESES 6 MESES	INTRAMUSCULAR SUBCUTÁNEA 45°	DELTOIDES O REGIÓN ANTEROLATER AL DEL MUSLO SEGÚN LA EDAD	0.5ML	12 A 15 MESES, MAYORES DE 65 AÑOS CADA 5 AÑOS	FIEBRE ENFERMEDADES IMPORTANTES ALERGIAS	VACUNA INACTIVA



VPH	PAPILOMA HUMANO IRÍDEA	9 A 14 AÑOS	INTRAMUSCULAR	BRAZO IZQUIERDO	0.5ML	2 MESE DESPUÉS DE LA PRIMERA Y LA TERCERA A LOS 6 MESE DE LA PRIMERA	FIEBRE DE 38.5° ANTECEDENTES DE ALERGIA GRAVE	VACUNA SUBUNIDADES
TD	TÉTANOS DIFTERIA	15 AÑOS	INTRAMUSCULAR	BRAZO IZQUIERDO	0.5ML	5 a 10 AÑOS	SI HA TENIDO SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE FIEBRE FEBRIL	ACTIVA
TDPA	TÉTANOS DIFTERIA TOS FERINA	EMBARAZADA DE LA SEMANA 20 A 32 DE GESTACIÓN	INTRAMUSCULAR	BRAZO ISQUIERDO	0.5ML	MUJERES EMBRAZADAS DE 20 A 32 SEMANAS DE GESTACIÓN	ENFERMEDAD NEUROLÓGICA	ACTIVA

