



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Campus Comitán

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Materia: Salud Publica

Por: Eunice Yamileth Roblero Rodríguez

Catedrático: Arely Alejandra Aguilar Velasco



1 - "D"

Esquema de Vacunación

Nombre de la Vacuna	Patógeno	Edad	Vía de administración	Dosis	Sitio de aplicación
BCG	Tuberculosis miliar y meningea	Persona recién nacida	Intradérmica	Dosis única 0.1 mL	Región deltoidea de brazo derecho (región superior del músculo deltoideo)
Hepatitis B	Hepatitis B	Al nacer 2 meses 6 meses	Intramuscular	0.5 mL	<ul style="list-style-type: none"> Tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo - Neonatos Región deltoidea del brazo derecho
Hexavalente (DTPa + VIP + Hib + HB)	Difteria Tos ferina Tétanos Poliomielitis H. influenzae b	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses (refuerzo)	Intramuscular	0.5 mL	<ul style="list-style-type: none"> En los menores de 18 meses aplicar en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho A partir de los 18 meses, en la región deltoidea del brazo izquierdo.
DPT	Difteria Tos ferina Tétanos	4 años	Intramuscular	0.5 mL	Región deltoidea del brazo izquierdo
SRP	Sarampión Rubeola Parotiditis	1ª dosis 12 meses de edad 2ª dosis 18 meses de edad ----- 2ª dosis 6 años / ingresar a 1º de primaria	Subcutánea	0.5 mL	Región deltoidea del brazo izquierdo
TD	Tétanos Difteria	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 15 años de edad Embarazadas (sin esquema de vacunación) Refuerzo, cada 10 años 	Intramuscular	0.5 mL	Región deltoidea del brazo izquierdo
Tdpa	Tétanos Difteria Tos ferina	<ul style="list-style-type: none"> Embarazadas, a partir de la semana 20 de edad gestacional Refuerzo, cada 10 años 	Intramuscular	0.5 mL	Región deltoidea del brazo izquierdo
SR	Sarampión Rubeola	≥ 10 años	Subcutánea	0.5 mL	Región deltoidea del brazo izquierdo
Antineumocócica conjugada	Streptococcus pneumoniae	2 meses 4 meses 12 meses	Intramuscular	0.5 mL	Tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho
Rotavirus	Rotavirus	2 meses 4 meses	Oral	1.5 mL	
VPH	Virus del papiloma humano	≥ 11 años	Intramuscular	0.5 mL	Región deltoidea del brazo no dominante
Varicela	Varicela-zóster	12 meses 4-6 años	Subcutánea	0.5 mL	Región deltoidea o tricipital del brazo izquierdo