

SALUD PUBLICA

ESQUEMA DE VACUNACION

The image shows two overlapping vaccination schedule charts. The left chart is a detailed table with columns for 'VACUNAS', 'INDICACIONES QUE PROPORCIONAN', 'TIPO', 'EDAD Y FRECUENCIA', and 'FECHA DE VACUNACIÓN'. It lists various vaccines like BCG, Hepatitis B, Polio, etc., with their respective schedules. The right chart is a more simplified version of the same schedule, with a similar layout but less detailed text.

María Fernanda Miranda López

1-D

Dra. Aguilar Velasco Arely Alejandra

Universidad del sureste

Medicina humana



vacuna	Contra que antígeno protege	edad	Numero de dosis	Via de administracion	contraindicaciones	Dosis en ml
BCG	tuberculosis	al nacimiento	Una sola dosis	Intradérmica (región deltoidea)	No recomendado en bebés con: bajo peso (menor de 200gr) VIH, inmunodeficiencias congénitas	0.1 ml
Hepatitis B	Hepatitis B	Al nacer 2 meses 6 meses	Tres dosis	Intramuscular (muslo)	Reacciones graves previas a esta vacuna Alergia a algún componente de esta	0.5 ml
Hexavalente celular	Difteria Tos ferina Tetanos Poliomelitis Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis tipo B	2, 4 y 6 y 18 meses	Cuatro dosis	Intramuscular (muslo en lactantes y musculo deltoideo en niños)	reacción alérgica a algún componente de la vacuna Si ha tenido encefalopatía de causa desconocida dentro de 7 días a la administración de esta	0.5 ml
DPT (triple bacteriana)	Difteria Tos ferina tetanos	Entre 4 y 6 años	Refuerzo	Intramuscular (brazo)	una enfermedad grave, con o sin fiebre, temperatura mayor a 38°C, enfermedades infecciosas o alérgicas, o si tiene cuadros convulsivos	0.5

Rotavirus	Rotavirus (previene gastroenteritis grave)	2, 4 y 6 meses / O los 2 y 4 meses	RV5: 3 dosis / RV1; 2 dosis	Oral (gotas)	reacción alérgica (anafilaxia) Si tiene fiebre mayor a 38.5°C, diarrea y vomito, antecedente de alguna enfermedad crónica de los intestinos	1.5ml o 2 ml dependen de la vacuna que se utilice
Neumocócica conjugada	Neumococo (previene infecciones como neumonía, meningitis y sepsis)	2, 4, 6 y de 12 a 15 meses	Cuatro dosis	Intramuscular bebés en el músculo vasto y en niños mayores y adultos músculo deltoides	No se debe vacunar si ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a la vacuna o a alguno de sus componentes Se debe posponer si hay alguna infección	0.5 ml
influenza	Influenza estacional	partir de los 6 meses	Anual	intramuscular (brazo)	Reacción alérgica grave a una dosis previa, fiebre alta en el momento de la vacunación, enfermedades graves o agudas.	0.5 ml
SRP (triple viral)	Sarampión Rubeola parotiditis	1 año y 6 años	Dos dosis	Subcutánea (brazo)	No se utiliza en embarazos, inmunodeficiencias graves, alergias a dosis previas o componentes de esta (ej. Neomicina)	0.5 ml
Hepatitis A	Hepatitis A	entre los 12 y 23 meses y	Dos dosis	Intramuscular (muslo o brazo)	reacción anafiláctica a una dosis previa, hipersensibilidad	0.5 ml

		la segunda dosis entre los 6 y 18			grave a algún componente de las vacunas	
TD (tetanos y difteria)	Tetanos y difteria	Se aplica a niños mayores de 7 años, adolescentes y adultos	una dosis con un refuerzo cada 10 años	Intramuscular (brazo o muslo)	Si se ha tenido reacción alérgica a una dosis de esta Si se ha tenido síndrome de Guillan Barre Si se tiene una enfermedad grave con o sin fiebre	0.5
VPH	Virus del papiloma humano	9 y 11 años	Dos dosis	Intramuscular (brazo)	Embarazo Reacción alérgica grave o dosis anteriores o componentes. Fiebre alta al momento de la vacunación, Enfermedad grave o moderada	0.5ml
Doble viral (SR)	Sarampión y rubeola		Refuerzo en adultos	Subcutánea (brazo izquierdo)	Si la persona ha tenido una reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna Si la persona está embarazada	0.5 ml