



SALUD PUBLICA I.

Esquema de vacunación.

Alumno: Santiago López José Enrique .

Docente: Dra. Aguilar Velasco Arely Alejandra.

Comitán de Domínguez, Chiapas.

07/11/2024

Esquema de vacunación

VACUNA	Contra que antígeno.	EDAD	DOSIS	VÍA
BCG	Tuberculosis menígea y miliar.	<ul style="list-style-type: none"> • AL NACER. • MENOR DE 5 AÑOS. • MENOR DE 14 AÑOS. 	Única (0.1ML).	INTRADÉRMICA.
HEPATITIS B	Hepatitis B.	AL NACER 7 DÍAS. 2 MESES. 4 MESES. 6 MESES.	0.5ML.	I.M
HEXAVALENTE ACELULAR	Difteria, Tétanos, tosferina, Hepatitis B, Influenzae B y Poliomielitis.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MESES. • 4 MESES. • 6 MESES. • 18 MESES. 	0.5ML.	I.M
DPT	Difteria, Tosferina, Tétanos.	REFUERZO 4 AÑOS.	0.5 ML.	I.M
ROTAVIRUS	Diarrea por rotavirus.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MESES • 4 MESES • 6 MESES 	0.5 ML.	ORAL
NEUMOCÓCICA CONJUGADA.	Infecciones por neumococo.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MESES. • 4 MESES. • 12 MESES. 	0.5 ML.	I.M
INFLUENZA	Influenza.	<ul style="list-style-type: none"> • 6 MESES. • 7 MESES. • ANUAL HASTA LOS 35 MESES. 	0.25 ML.	I.M
SRP	Sarampión, Rubeola, Parotiditis.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 AÑO. • 6 AÑOS. 	0.5 ML.	SUBCUTÁNEA.
SABIN	Poliomielitis.	<ul style="list-style-type: none"> • 6-4 AÑOS. 	0.1 ML.	ORAL.
SR	Sarampión y rubeola.	<ul style="list-style-type: none"> • REFUERZO. 	0.5ML.	SUBCUTÁNEA.