



LICENCIATURA EN
MEDICINA HUMANA



Dr. Romeo Suarez Martinez

Arturo Rodriguez Ramos

Sellos de los trabajos

Geriatría

Sexto semestre

“A”



Accidente cerebrovascular


(ECV) / Es la primera causa de muerte en los países desarrollados. La causa más frecuente de epilepsia en el anciano, una causa frecuente de depresión y la primera causa de discapacidad grave en el adulto.

- El código Ictus permite un rápido proceso de identificación, notificación y traslado de los pacientes a los servicios de urgencias hospitalarias
- La unidad de ictus es la aproximación más eficaz y eficiente en el manejo de la fase aguda del ictus isquémico o hemorrágico.

- Concepto

Se denomina ictus al trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región del encéfalo

excelencia



Trastorno de conciencia

• De los ictus isquémicos se clasifican en modificables potencialmente modificables y no modificables

Clasificación Ictus

- Criterios clínicos
- Topográficos
- Patogénicos
- Diagnósticos
- Pronósticos

- según su producción
- según su etiología
- según su topografía

Las accidentes cerebrovasculares

Epilepsia en el anciano

~~Epilepsia~~
→ Es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición a padecer crisis epilépticas y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y social según la ICD-10 / se entiende como un síndrome y no como una enfermedad.


• Se considera epilepsia en el anciano a la que comienza en mayores a 65 años.

Epidemiología

• En los países desarrollados, la incidencia y la prevalencia de epilepsia en el anciano son mayores que en cualquier otra grupo de edad a las 70 y 80 años la incidencia es el doble y el triple que en la infancia respectivamente.

• La epilepsia es el tercer síndrome neurológico en frecuencia en ancianos tras la enfermedad cerebrovascular y la

excelente



Las crisis epilépticas son el 15% de las afecciones cerebrales

~~Etiología~~
• Etiología vascular representa el 40% de crisis epilépticas afecciones tumorales 15%, tumores leptomeningeaes del sistema nervioso 17% e idiopática

Clasificación y síndromes en el anciano

- Crisis agudas
- Crisis recurrentes
- Estatus epiléptico
- Epilepsias parciales
- Síndromes epilépticos
- Síndromes epilépticos con crisis focalizadas.

Trastorno En la vejez diabético

→ La Diabetes mellitus en el anciano.

Es una enfermedad muy prevalente en este rango etario, es una enfermedad crónica, tiene enorme repercusión sobre la función al generar por sí sola (independientemente de sus complicaciones) pérdida de la función, incrementa el riesgo de caídas, de padecer depresión y desarrollo de deterioro cognitivo.


• Su mortalidad / la causa cardiovascular es la principal causa de muerte en ancianos y ella supone un enorme coste social.

La prevalencia.

• Se incrementa a medida que aumenta la edad, de todos los diabéticos conocidos, el 40% supera los 65 años / Framingham Heart Study indican su incidencia se ha doblado en los últimos 30 años.

• El manejo farmacológico indicado en cada caso o los métodos farmacológicos (el papel de la dieta y el ejercicio).

muy bien




• Tipo 2 tiene una fuerte carga genética - probablemente en un patrón poligenico cuya expresión está modulada por factores ambientales.

• El hecho fundamental en el anciano es de la insulina lugar de nacimiento con el envejecimiento habitual, que a lo largo del tiempo responsable del agotamiento de la célula beta y la consiguiente

Causas

Responsables de la secreción de insulina por las células beta de una disfunción de la masa celular causa de la resistencia a la insulina de aparatos de capacidad ambiental metabólica

Dr. Romeo Suarez Martinez



revisado

Astura Rodriguez Ramos

Trastorno Neurológica
parkinson - parkinsonismo

Geriatría

sexto semestre

"A"

Cantón de Damaz de Chica a 27 de



- Siguiente sello es un:
(excelente)