



UDRS

Mi Universidad

Infografía

Alexa Avendaño Trujillo

Fiebre de origen desconocido

6 "A"

Enfermedades infecciosas

Dr. Christian Jonathan Aguilar Ocampo


Comitán de Domínguez Chiapas.



FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

- Cualquier enfermedad febril sin una causa evidente inicial
- Fiebre > 38.3 C
- Duración > 3 semanas
- Sin compromiso inmunitario
- Pirogenos endógenos IL 1,6 y 8


TIPOS




FOD asociado al VIH

- VIH (+), > 3 días de adecuados estudios > 2 días de incubación del cultivo o > 4 semanas en pacientes ambulatorio.

FOD pediátrica




- >14 días a pesar de un adecuado protocolo diagnóstico o > 1 semanas en el hospita.




FOD neutrópenica

- Neutropenia
- < 500 en pacientes con > 3 días de protocolo de estudio o > 2 días de incubación del cultivo

FOD clásica



- Persistente >3 semanas
- Persistente después >3 visitas al médico
- Persistente después > 3 días, de hospitalaria




FOD neutrópenica

- Persistente fiebre en pacientes hospitalizados >24 h en ausencia de infección previo con > 3 días o >2 días de incubación del cultivo

Diagnostico

- Anamnesis
- Exploración física
- Gammagrafía
- Tomografía por emisión de positrones de fluorodesoxiglucosa



Tratamiento

- Antibiótico
- Antituberculoso
- AINES
- Colquicina
- Anakinra