



**Universidad del Sureste
Campus Comitán
MEDICINA HUMANA**

Alumna:

Esthephany Michelle Rodríguez López

Materia:

**INFECTOLOGÍA
INFOGRAFIA OTITIS MEDIA AGUDA**

Grado: 6 Grupo: A

OTITIS MEDIA AGUDA

DEFINICIÓN

Inflamación del oído medio, de inicio súbito, que se caracteriza por la presencia de líquido, asociada a signos y síntomas de inflamación local.



1)

CLINICA

- Inespecíficos, similares a los de una infección respiratoria alta aguda.
- Inicio agudo (<48hrs) de inflamación de oído medio



2)

ETIOLOGÍA

- Infecciones
- Alergias
- Barotrauma



Bacterianas:

- S. Pneumoniae
- H. Influenzae
- Moraxella cathrrhalis

Virales:

- VSR
- Parainfluenza
- Influenza



3)

FX RIESGO

- <2 años
- Ausencia de lactancia
- Asistencia a guarderías
- Uso de chupón
- Exposición al humo de cigarro
- Ausencia de vacuna Antineumococo
- Mala higiene de manos



4)

OMA CON DERRAME

- Oído enrojecido
- Falta de respuesta a las voces
- Alteraciones del lenguaje
- Dolor intermitente del oído medio

TX



- Colocación de tubos de ventilación para drenar el derrame

5)

TRATAMIENTO

- Amoxicilina a dosis elevadas, es el antimicrobiano de elección en cada episodio de OMA
- 80 a 90 mg/Kg de peso por día durante 5 a 10 días
- Manejo del dolor: Paracetamol o ibuprofeno 10-15mg/kg/dosis
- Amoxicilina o amoxicilina-acido clavulánico: 10-14 días en niños con Fx riesgo

6)

Prevención, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda en la edad pediátrica. (2022). GPC.
<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/496GRR.pdf>