

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITÁN**


**TRABAJO:
INFOGRAFÍA OTITIS MEDIA AGUDA**

**MATERIA:
ENFERMEDADES INFECCIOSAS**




**GRADO Y GRUPO:
6° "A"**

**DOCENTE:
DR. AGUILAR OCAMPO CRISTIAN JONATHAN**



OTITIS MEDIA AGUDA



Es una enfermedad del oído medio, de inicio súbito, que se caracteriza por la presencia de líquido, asociada a signos y síntomas de inflamación local.

Virales (41%)

Etiología

- Infecciones respiratorias agudas
- Alergias
- Barotrauma


1. VSR
2. Parainfluenza
3. Influenza

BACTERIANAS

1. *S. pneumoniae* (la más común)
2. *H. influenzae*
3. *Moraxella catharrhalis*

Factores de riesgo

- Menor de 2 años (Trompa de Eustaquio más horizontal)
- Ausencia de lactancia
- Asistencia a guarderías
- IRA
- Uso de chupones (asociado a Otitis Media Recurrente)
- Uso de biberones
- Exposición al humo de cigarro (asociado a Otitis con Derrame)
- Presencia de alérgenos
- Mala higiene de manos
- Ausencia de Vacuna Anti neumococo (2, 4 y 12 meses)
- Predisposición genética
- Reflujo gastroesofágico



Cuadro clínico

Fiebre

Irritabilidad

Anorexia

Otalgia

Vomito

Eritema

Hipoacusia

Signo de Trago



Diagnostico

- HC-EF
- Otoscopio neumático
- Inflamación de membrana timpánica
- Movilidad de la membrana timpánica limitada o ausente
- Nivel hidroaéreo detrás de la membrana timpánica
- Otorrea

EXPLORACION FISICA

- ⇒ Membrana Timpánica Abombada
- ⇒ Disminución de la Movilidad de la Membrana Timpánica
- ⇒ Líquido o Derrame en Oído Medio

Síntomas inespecíficos: tos, rinitis, rinorrea, hiporexia y vómitos.

Tratamiento

Antimicrobianos:

1. Amoxicilina -> 80 a 90 mg/Kg de peso
2. Amoxicilina con ácido clavulánico -> 80 a 90 mg/Kg de peso
3. Clindamicina-Azitromicina

AINES -> Paracetamol y Ibuprofeno (Manejo de dolor)

