



**Universidad del sureste
Medicina humana**



**Trabajo:
Infografía**

**Nombre del alumno:
Hugo de Jesus Monjaras Hidalgo**

**Grado y Grupo
6 "A"**

**Materia
Enfermedades Infecciosas**

**Docente:
Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo**

Comitán de Domínguez Chiapas a 8 de noviembre del 2024

OTITIS MEDIA

AGUDA

DEFINICIÓN



ES UNA ENFERMEDAD DEL OÍDO MEDIO, DE INICIO SÚBITO, QUE SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE LÍQUIDO, ASOCIADA A SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFLAMACIÓN LOCAL

ES CAUSADA POR MÚLTIPLES FACTORES, QUE ALTERAN LA FUNCIÓN DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO, Y SE INCLUYEN: INFECCIONES, ALERGIA O BAROTRAUMA

FX DE RIESGO

ASISTENCIA A GUARDERÍA, EXPOSICIÓN AMBIENTAL A HUMO DE CIGARRO Y OTROS IRRITANTES RESPIRATORIOS Y ALERGENOS, FALTA DE ALIMENTACIÓN CON LECHE MATERNA, POSICIÓN SUPINA PARA LA ALIMENTACIÓN, USO DE CHUPONES, ANORMALIDADES CRANEOFACIALES, DEFICIENCIAS INMUNOLÓGICAS



DIAGNÓSTICO

HISTORIA DE INICIO AGUDO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRESENCIA DE LÍQUIDO EN OÍDO MEDIO

IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFLAMACIÓN DEL OÍDO MEDIO MEDIANTE TOSCOPIO NEUMÁTICO

Signos y síntomas

- IRRITABILIDAD
- FIEBRE
- HIPOREXIA
- FALTA DE SUEÑO
- ESCURRIMIENTO NASAL
- CONJUNTIVITIS
- DISMINUCIÓN DE LA AUDICIÓN
- OTALGIA



CRITERIOS PARA OM CON DERRAME

- OÍDO ENROJECIDO, IRRITABILIDAD O ALTERACIONES DEL SUEÑO EN LACTANTES
- FALTA DE RESPUESTA DE LOS LACTANTES A LAS VOCES O SONIDOS AMBIENTALES
- ALTERACIONES DEL LENGUAJE

- DOLOR INTERMITENTE DE OÍDO MEDIO
- PROBLEMAS CON EL DESARROLLO ESCOLAR
- OTOSCOPIA NEUMÁTICA CON MEMBRANA TIMPÁNICA OPACA O AMARILLA, EN POSICIÓN NEUTRAL O RETRAÍDA, CON DISMINUCIÓN DE LA MOVILIDAD O NIVEL HIDROAÉREO

TRATAMIENTO

-LOS ANTIMICROBIANOS DEBEN INDICARSE CUANDO SE REQUIERE REDUCIR LA MORBILIDAD QUE NO PUEDE DISMINUIR CON EL USO DE ANALGÉSICOS

-LA AMOXICILINA A DOSIS ELEVADAS, ES EL ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN EN CADA EPISODIO DE OMA

-EL MANEJO DE LA OMA EN NIÑOS DEBE INCLUIR EL MANEJO DEL DOLOR Y LA FIEBRE, POR LO QUE SE RECOMIENDA UTILIZAR ANALGÉSICOS-ANTIPIRÉTICOS PARA EL CONTROL DE LOS SÍNTOMAS EN EL PACIENTE, POR LO QUE PUEDE INDICARSE PARACETAMOL O IBUPROFENO

-NO SE RECOMIENDA EL USO DE GOTAS ÓTICAS, CON O SIN ANTIBIÓTICO, GOTAS NASALES, MUCOLÍTICOS O ANTIHISTAMÍNICOS, PUES NO APORTAN BENEFICIOS AL TRATAMIENTO DE LA OMA



Bibliografía

Guía de Práctica Clínica GPC, otitis media aguda en la edad pediátrica