

# Abdomen Agudo

## Definicion

Síndrome clínico que engloba a todo dolor abdominal de instauración reciente (generalmente de menos de 48 horas de evolución o hasta 6 días) con repercusión del estado general,

## Estadística

casos de dolor abdominal agudo, el 50% requiere hospitalización y cirugía en el 30 - 40%.

Aproximadamente el 40% obtienen un diagnóstico erróneo a su ingreso. Solo el 60% de los casos que ingresan son diagnosticados correctamente

## CAUSAS INTRA ABDOMINALES y extra abdominales

Dolor Abdominal:  
agudo <6días  
medio de 6d a 3m  
cronico >3m  
  
Agudo 48h, 30% requiere cirugía.

Requiere cirugía si hay hemorragia, obstrucción, infección, isquemia o perforación.

## Dx

HC, LABS, IMAGEN. Realizar A.L.I.C.I.A. Bh Qs EGO Amilasa y lipasa. Gold Standar: TAC.

## Clinica

DOLOR  
RIGIDEZ  
ABDOMINAL  
INCREMENTO DE  
LA SENSIBILIDAD  
ABDOMINAL CON O  
SIN REBOTE

## Ejemplos

HOMBRO DERECHO:  
VESICULA BILIAR  
HIGADO  
HEMIDIAFRAGMA  
DERECHO

HOMBRO IZQ:  
CORAZÓN  
COLA DE PANCREAS  
BAZO

TODO PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO CON DIAGNÓSTICO INCIERTO CANDIDATO A CIRUGÍA DE LAPAROSCÓPICA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE Y CON MORBILIDAD ASOCIADA DEBE SER ENVIADO A HOSPITAL DE ESPECIALIDAD EN DONDE SE CUENTE CON EL RECURSO LAPAROSCÓPICO Y PERSONAL CALIFICADO.

## Tx

TODO PX CON RESOLUCION QX NO COMPLICADA SERÁ CITADO PARA RETIRO DE PUNTOS EN 7 A 10 DIAS DE POSTOPERATORIO

TODO PX CON RESOLUCION QX SERÁ CITADO EN 15 DIAS PARA VALORACION Y ALTA DEL SERVICIO DE CX EN DONDE FUE INTERVENIDO