

SDTD ALTO Y BAJO

GENERAL

CLASIFICACION

STD AGUDO: 120 horas
5 días
STD CRÓNICO: >6D.
Alto: 50%
BAJO: 40%
OBSCURO: 10%

EPIDEMIO:
83-100/10000

**AUMENTA CON LA
EDAD**

CLINICA

VOMITO DE SANGRE ROJA
BRILLANTE
SANGRADO RECIENTE O EN
CURSO
SUGIERE DAÑO EN ESOFAGO,
ESTOMAGO O DUODENO.

HEMATOQUECIA

MELENA

CLINICA

VOMITO DE SANGRE OSCURA
SANGRADO SUB AGUDO
SANGRE PARCIALMENTE
DIGERIDA

CARACTERÍSTICAS

HECES CON SANGRE ROJA BRILLANTE
PUEDE O NO ESTAR RELACIONADA CON
LAS HECES

APARECE POSTERIOR A 50-100 ML
SANGRADO
SE PRESENTA HORAS DESPUES DEL
SANGRADO O HECES COLOR ALQUITRÁN

ALTO

DEFINICION

DEFINICIÓN: TODO AQUEL SANGRADO
ORIGINADO POR LESIONES EN EL TUBO
DIGESTIVO EN FORMA PROXIMAL, 80% de
los casos y dx <48h evita transfucion

CAUSAS

EJEMPLOS

SUBTEMA INTELIGENTE

NUMEROSAS EROSIONES SUPERFICIALES
PANGASTRICAS
PACIENTE EN ESTADO CRITICO - < INCIDENCIA
SANGRAN ABUNDANTEMENTE
MALFORMACIONES VASCULARES CURV MENOR <
6CM

DX

Tabla de forrest

TX

Indicaciones para cirugia
compatibles

BAJO

DEFINICION

TODO AQUEL SANGRADO ORIGINADO POR
LESIONES EN EL TUBO DIGESTIVO EN
FORMA DISTAL AL LIGAMENTO DE TREITZ,
prevalente 20-80 años

ETIOLOGIA

CAUSAS

HEMORRAGIA DIVERTICULAR
COLITIS
ENFERMEDADES PERIANALES
ANGIODISPLASIAS
DIVERTICULO DE MECKEL

DX

Clinico, estudios de laboratorio,
globulos rojos tc99.

EJEMPLOS

CAUSAS

COLITIS INFECCIOSA ES
CAUSADA PRINCIPALMENTE
POR:
AMIBIASIS
DISENTERIA
TUBERCULOSIS

TX

COLECTOMIA



UDS

SERGIO FABIAN TREJO RUIZ

6A

**MAPAS CONCEPTUALES, SDTD Y ABDOMEN
AGUDO**