

Materia:
Clínicas medicas complementarias

Nombre del trabajo:
flashcards

Alumno:
José Manuel López Cruz

Grupo: "A"
Grado: "7"

Docente:
Dra. Adriana Bermúdez Avendaño

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de septiembre de 2024

Dermatosis Atópica

Frecuente en niños < 5 años, - ADOLESCENCIA

Factores de Riesgo: AHE Atópicas, Clima Seco x frío, diatesis atópica (asma, rinitis, conjuntivitis), ácaros, bacterias, alimentos

Clinico: Placa como en cara, Respeto triángulo facial, Prurito

- Agudas: queratosis folicular, dermatosis plantar, hiperlinealidad palmar, ^{líneas} pennic margin

- Crónicas: Placas queratosis, liquificación, hiperlinealidad palmar

Diagnostico: Clínico: Piel Seca, prurito, eccema, dermatitis, lactente
Laboratorio: Eosinofilia periférica + IgE elevada, Criterios de Hanifin y Rajka

Tratamiento: Cortar uñas para evitar daño por rascado
- mantener piel seca y limpia

- Ciclosporina
- infliximab
- metotrexato
- fototerapia
- azotioquina
- mometasona

FIRST CLASS.

Dermatofitosis o Tineas Tricofonosis

micosis Superficiales que afectan la piel (Cabello y piel)

- Causa → Hongos parásito de la queratina
→ Dermatofitos



Tres generos:

- Trichophyton → t. rubrum ↑
- Microsporum
- Epidermophyton

Diagnostico:

- Directo con hidróxido de potasio
- Cultivo

- Tinea de piel Cabellosa → Infarosa (98%)

Herpes Zoster



Colebrilla - erupción cutánea vesicante y dolorosa
- varicela zoster

- Después de la varicela el virus queda inactivo

Se presenta en cualquier edad

- * Tiene 60 años
- * Varricela antes de cumplir un año
- * Sistema inmunitario

Síntomas:

Dolor en solo lado, hormigueo o ardor. antes de erupción

Parche en la piel, ampollas → Se rompen →

- Forman costras → Se Cuan 2-3 Sem, ↓ Cicatriz

Carcinoma Basocelular

- Tumor maligno más frecuente

- Tipo de CA frecuente en Raza Blanca

Factores de Riesgo

- Exposición solar
- Radiación UV
- Síndromes genéticos: síndrome de Gorlin de Rombo, de Bazex

Localización y presentación

Sobre piel sana, papula de crecimiento lento y progresivo al brillo perlado. telangiectasias ramificadas, glóbulos pigmentados

Dx. Dermatoscopia (hojas de uñas, de Montano de Corro)

Tx Quirúrgico - de Mohs

Carcinoma espinocelular

Segundo más frecuente

Ft de Riesgo

- Exposición solar
- Inmunosupresión
- Úlcera crónica
- Tabaquismo
- VPH
- Radiación

Localización

- Sobre lesiones premalignas
- Cara
- Cuello, cabello

Presentación

- Placas eritematosas
- Nódulos palmoplantares
- Crecimiento rápido
- Mucosa: se ulcera y sangra

Diagnóstico

- Clínico
- Histológico: perlas de queratina

Tx i Dx Curetaje o electrocauterización

Melanoma

- Tumor maligno que se desarrolla a partir de melanocitos
- 3ra neoplasia más frecuente en México
- Presentación: Nódulo
- CEN → CERNZA

Ft de Riesgo

- Antecedentes familiares
- > 100 nevos comunes
- > 3 nevos atípicos displásicos
- Radioterapia en infancia

Localización

- Piel
- Mucosas
- Retina
- Leptomeninges

Presentación

- Papula
- Nódulo pigmentado, pruriginoso, sangrante
- A = Asimetría
- B = Bordes irregulares
- C = Color variante
- D = Diámetro > 6 mm
- E = Evolución 1-2 meses

Diagnóstico

Biopsia excisional de lesión
Tx: Biopsia

