

Tema: Flash-Cards cirugía

Nombre: Gerardo Pérez Ruiz

Grupo: A

Grado: 7

Materia: clínicas complementarias

Docente: Dr. Erick Antonio flores Gutiérrez

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de septiembre de
2024

Enfermedad Hemorroidal

Definición:

Es una dilatación venosa del conducto anal de plexos hemorroidales internos y externos

Epidemiología: Nombres)
45-65 años

Factor de riesgo:

- Dieta baja en fibra
- Estreñimiento prolongado

Fisiopatología

Un esfuerzo excesivo elevando la presión intraabdominal y anal llevando a la ruptura vascular

Clinica:

- Hemorroide interna
- sin dolor
- Heces con ralo rotilante, separado de las heces
- Prurito

Complicaciones

- Prolapso
- Trombosis

TX: -analgesia

- Baños tibios
- Aplicación de lidocaína

TX-OX: Hemorroidectomía quirúrgica

Absceso y fistula perineal

Definición:

Absceso: colección purulenta de los espacios celulo adiposos del conducto anal

Fistula: comunicación orrribante entre 2 superficies epiteliadas

Etiologia

Especificas: - Enfermedad intestinal inflamatoria

NO especificas:

- criptosporidiosis
- infección por obstrucción

- Tuberculosis
- trauma tórax

Factor de riesgo: Diagnostico

- Diarrea
- Trauma
- Varicela
- Nematoma
- Clinica
- Endoscopia
- Sigmoidoscopia

Epidemiologia

- Hombrs
- 20-40 años

TX: Abscesos

- Drenaje
- Antibiotico

TX: fistulas

- identificar trayecto secundario

clinica:

Absceso:

- fiebre
- Dolor
- eritema
- secreción purulenta
- sangrado

Fistula

- Excoriación anal

- fistulotomia
- fistulectomia

Enfermedad Hemorroidal

Definición:

Es una dilatación venosa del conducto anal de plexos hemorroidales internos y externos

Epidemiología: Nombres:
45-65 años

Factor de riesgo:

- Dieta baja en fibra
- Estreñimiento prolongado

Fisiopatología

Un esfuerzo excesivo elevando la presión intraabdominal y anal llevando a la ruptura vascular

Clinica:

- Hemorraide interna
- Sin dolor
 - Heces con ralo rojilante, separado de las heces
 - Prurito

Complicaciones

- Prolapso
- Trombosis

TX: analgesia
- Baños tibios
- Aplicación de lidocaína

TX-OX: Hemorroidectomía quirúrgica

Enfermedad
diverticular

Definición

Diverticulosis: presencia de divertículos en colon

Diverticulitis: Existe inflamación o infección de divertículo

Enfermedad: manifestación de síntomas, como dolor
Diverticular

Factor de riesgo

- Genéticos
- uso de AINES Aspirina
- Alimentación sin fibra

Clinico: Dolor fosa ileocecal izquierda
- masa palpable

Diagnóstico

- Hemograma
- PCR
- Orucultivo
- TAC

Complicaciones

- Absceso
- fistula

Clasificación

- Hinchey

Tratamiento ambulatorio

antibiótico: ciprofloxacino
- levofloxacino
TMP/SMX

- Dieta: Alta en fibra

Tratamiento hospitalario

Antibiótico = metronidazol
intravenosa tozobactam

Líquido = lactato de Ringer

Analgesico: Acetaminofen

Dieta = líquida

volvulo de colon

Definición: Es la torsión de un orsono sobre su pediculo vascular

Factor de riesgo: - Sexo masculino
- Estreñimiento cronico
- Retorno nental

clinico:
- dolor abdominal
- distorsión abdominal
- ausencia de cardiasión de 300
- vomito
- Pseudo peristaltico fono metotico

Diagnostico:

- clinico
- BH
- QS
- Electrolitos

Imagen

- RX: signo de o invertido
- Enema de bario
- Tac abdomen

Tt quirurgico

- Pectosigmoidoscopia
- colonoscopia de emergencia
- Resección del ciego

Tratamiento

medico:

- Descompresión intetinal
- Balance hidroelectrolitico
- control de liquido

Secuencia de intubación
rápida

Definición: método para realizar intubación endotraqueal que precede a la parálisis

Formas de usar

- Fentanilo 1-3 mg/kg
- Rocuronio 0.6-1 mg/kg
- Lidocaina 1.5 mg/kg

Escalas

SOAPME / Lemon

Factor anatómico

Hematomas
oído corto y gracioso
Traumatismo facial
Ascitis - obesidad

usos/clasificación de Mallon Pott

- 1) sin dificultad
- 2) sin dificultad
- 3) dificultad moderada
- 4) difícil

Inducción

- Propofol estable 2 mg/kg
- inestable 0.5 mg/kg

Relajante muscular

Rocuronio 0.6-1.2 mg/kg

Succinilcolina 0.4-1.2 mg/kg

