



**UNIVERSIDAD DEL
SURESTE**

TÉSIS

**PREVALENCIA DEL IMPÉTIGO EN NIÑOS MENORES DE 6
AÑOS QUE CURSAN EL PREESCOLAR DR. BELISARIO
DOMÍNGUEZ PALENCIA.**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**

PRESENTA:

WILLIAM DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE TESIS

MARÍA VERÓNICA ROMÁN CAMPO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, MÉXICO

INTRODUCCIÓN

El impétigo es una infección cutánea común en niños, especialmente en aquellos menores de 6 años que asisten a preescolar. La prevalencia del impétigo en este grupo de personas es significativa, ya que se estima que hasta el 20% de los niños en edad preescolar pueden desarrollar esta condición en algún momento.

Sin embargo, el impétigo es causado por bacterias como el *Staphylococcus aureus* o el *Streptococcus pyogenes*, y se caracteriza por la aparición de ampollas o costras en la piel, generalmente en la cara, manos o pies. La infección se propaga fácilmente a través del contacto directo con la piel infectada o con objetos contaminados.

La alta prevalencia del impétigo en niños menores de 6 años que asisten a preescolar se debe a varios factores, incluyendo la proximidad y el contacto cercano entre los niños en el entorno preescolar, la falta de higiene personal y de lavado de manos regular, la presencia de heridas o cortes en la piel que pueden servir como puerta de entrada para las bacterias.

Es importante destacar que el impétigo es una condición tratable, y que la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones y reducir la propagación de la infección. Por lo tanto, es fundamental que los padres y los profesionales de la salud estén alertas para detectar los signos y síntomas del impétigo en niños menores de 6 años que asisten a preescolar

OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia del impétigo en niños menores de 6 años que cursan el preescolar Dr. Belisario Domínguez Palencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el porcentaje de niños menores de 6 años que cursan el preescolar que presentan o han presentado impétigo
- Definir las medidas de prevalencia del impétigo
- Avaluar la conciencia y conocimiento de los padres y maestros sobre el impétigo y su prevención en niños menores de 6 años