

TESIS

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL KINDER
NIÑO ARTILLERO

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

PRESENTA:

PAOLA GUADALUPE HILERIO GONZALEZ

ASESOR:

LIC.MARIA VERONICA ROMÁN CAMPO

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, MÉXICO

OBJEVI TO GENERAL:

CONOCER ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL
KINDER NIÑO ARTILLERO

Objetivos específicos:

Definir la sintomatología clave de las enfermedades diarreicas.

Conocer la frecuencia de las enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años.

Identificar las medidas de prevención enfermedades diarreicas

Examinar las complicaciones y defunciones por diarreica y deshidratación

Introducción

Las enfermedades diarreicas agudas representa la segunda causa de muerte en menores de 5 años debido a la deshidratación y esto en el ámbito de salud representa un problema de salud publica importante, es por ello que en el presente en este trabajo de investigación, hablaremos a cerca de las medidas de prevención de la deshidratación.

La WHO (World Health Organization) define a las enfermedades diarreicas agudas consiste en un aumento en el número de deposiciones y/o disminución en su consistencia de instauración rápida. se puede acompañar de signos y síntomas como nauseas, vomitos, fiebre, dolor abdominal, La causa más frecuente es la infección gastrointestinal, que produce gastroenteritis o inflamación de la mucosa gastrica o intestinal. Debido a ello es término diarrea aguda es prácticamente sinonimo de gastroenteritis aguda de causa infecciosa.

Según la WHI la muerte es 443 832 niños alta cantidad en cada año se define como diarrea a la deposición de tres o más veces al día con una frecuencia mayor de lo normal, sueltas o líquidas. La diarrea sue ser síntoma de una infección de tracto digestivo, que puede ser ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parasitarios. Los variados agentes infecciosos causantes de la diarrea se transmiten habitualmente por la vía **fecal-oral**.

Los rotavirus constituyen el principal agente etiologico productor de diarrea en la infancia, se acosian a una forma de enfermedad más grave e infectan prácticamente a todo los niños en los primeros 4 años de vida, dándose la enfermedad especialmente entre los 6 y 20 meses de edad.

Es importante conocer las principals complicaciones que tienen las enfermedades diarreicas en los niños, para prevenir dando a conocer los cuidados y tratamientos especificos de ello.