



Rojas Velázquez Joan Natael

Bermúdez Avendaño Adriana

Flash cards "principales patologías en dermatología"

PASIÓN POR EDUCAR

Clínicas Medicas Complementarias

7°B

Herpes Simple 1, 2

Infección producida por virus del Herpes simple 1, 2, afectan a la piel y mucosas oral o genital.


→ Besicelas en una base eritematosa

→ Se caracteriza por una o varias vesículas agrupadas. (Pacimos)

Clasificación

- I. Estomatitis: herpes labial, gingivostomatitis herpética
- II. Balanitis o vulvovaginitis genital → Genital

Fisiopatología



Herpes Zoster

Enfermedad infecciosa aguda y autolimitada que se produce por la reactivación del virus Varicela-Zóster.

→ Aparición repentina en la piel y nervios periféricos

- Suele ser intercostal, facial, lumbosacro y extremidades.

→ Prodromos hiperestesia, hormigueo, prurito, dolor punitivo y urtante → Vesículas en grupo sobre base eritematosa

- Se presenta en un solo dermatoma regularmente y de manera bilateral
- Causa astenia, febrícula especialmente en niños
- Mas agresivo en personas adultas y adultos mayores.



Dermatofitosis - Tiña

Afectan a la piel y a las estructuras queratinizadas. (Pelos y uñas)

+ FCTE → ^{EPidermophyton} Trichophyton rubrum.
Microsporum

→ **Tiñas no inflamatorias** → Se tratan con con derivados azólicos o terbinafina



No produce alopecia areata cicatricial

• Puede adquirirse del ambiente o animales ...

- Tiña del cuero cabelludo → Propia de la infancia. Placas alopecias. Descamación
- Tiña del cuerpo → Placa eritematosa descamativa. Puriginosa → Bordes Activos
- Tiña de los pies → Pie de atleta (Descamación interdigital)
- Tiña inguinal → Placas eritemato-descamativas
- Tiña ungueal → Hiperqueratosis subungueal con onicólisis.

Carcinoma Espinocelular

→ Exposición al sol etiología mas FCTE

Segundo tipo de cáncer cutáneo mas frecuente.

Clinica → Eritema - Descamación

↓
Mas queratósica ↓
Sobre lesión primaria → Puede dar metastasis → Puede afecta a mucosas

→ Queratinocitos del Estrato espeso

→ Metestasis ganglionares

FCTES.
Alto Riesgo

→ Queratoacantoma → Pápula cupuliforme simétrica

- Suole ser benigno
- Lesión de crecimiento rápido
- Suole extirparse Qx

→ Tx

- Extirpacion Qx
- Radioterapia
- In situ → Crioterapia.

Carcinoma Baso celular

Tumor maligno + FCTE → Proliferación de melanocitos atípicos

Exposición crónica al sol → Principal etiología

Clinica → Pápula rosada de brille perlada de crecimiento progresivo
Ulcerarse y sangrar

→ Formas clínicas

- Esclerodermiforme
- Superficial o multicéntrica
- Ulcus rodens
- No dolor
- Pigmentado
- No afecta mucosas
- Alteración de la vía Hólgohoy



→ Queratinocitos basales

Aparece en:

- Cabeza
- Cuello
- Extremidades y tronco

→ Tratamiento

- Elección - cirugía
- Radioterapia
- Crioterapia
- Electrocoagulación

Pediculosis - Piojos

- + Fcte es la pediculosis capitis
- Pediculosis corporis
- Pediculosis pubis

→ Enfermedad parasitaria que afecta la piel y el cuero cabelludo

• Síntoma fundamental es el prurito

- Excoriaciones
- Erupción urticarial
- Costos hemetocarios

→ Escoleros FCTE

→ Es hematofago

→ Pediculosis corporis se localizan en la ropa.

→ El tratamiento con aplicación tópica y sistémica

- Permetrina 1% loción
- Piretrina loción Shampoo
- Piperonal
- Butoxido
- Ivermectina VO 200-400ng x Kg
- Ivermectina loción 0.5%
- Alcohol Benzílico s/f

→ Lavar ropa - Jabones 50°C

→ Saliva del parásito es vasodilatadora y anticoagulante

→ Pediculosis pubis
Es común la presencia de maculas pardosas

Tumores cutáneos más agresivos por su capacidad de producir metástasis

- Neoplasia derivada de melanocitos

→ Melanoma tipo lentigo maligno

- 10%
- Mujeres ancianas
- 90% en cara / zonas fotoexpuestas de pieles envejecidas (crónicas)
- Nódulo negro uniforme
- Rápidamente invasor
- Fc de ulceración y sangrado

Melanoma

→ Melanoma nódulo

- 15%
- Hombres de edad media
- Sobre piel sana / cualquier zona
- Nódulo negro uniforme
- Rápidamente invasor
- Fc de ulceración y sangrado

→ M. extensión superficial

- 70% (1 metástasis)
- Mujeres jóvenes
- 30% nevus prurales
- Exposición intermitente
- Macula con mosaico de colores 4-5 años

Dermatitis Atópica

Es una enfermedad inflamatoria reaccional de la piel crónica y recidivante. (marcha atópica)

→ Clinica

- Se considera - observa un exantema, con eritema, costras hemáticas y liquenificación.

- Lactentes: Cara y área del pañal
- En niños: Pliegues corporales
- Adultos: Dorso y pies

Gravedad → SCORAD

→ Dx

- ≥ 3 criterios mayores
- ≥ 3 criterios menores

* Criterios de Hanifin y Rajka

→ Tx

- Evitar el desencadenante
- Hidratación
- Antihistamínicos VO
- Corticoides tópicos
- Evitar rascarse
- Lactancia en niños