

Licenciatura en medicina humana

Brayan Velázquez Hernández

Clínicas médicas complementarias

ADRIANA BERMUDEZ AVENDAÑO

Reporte de flash card

7to

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas 12/09/2024

melanoma cutáneo

→ Neoplasia derivado de la proliferación de melanocitos atípicos → melanocitos → cresta neural → cualquier parte del

CARACTERÍSTICAS

Factor de riesgo:

Asimetría

→ Historia de melanoma familiar

Bordes irregulares

→ EXPO. Solar y radiación UV totales 1/11

Color

→ Nevos, Nevos atípicos y efelides múltiples

Diámetro > 6mm

→ Mutación = Genética

Familiar

TIPOS PRINCIPALES

Gran # de nevos Δ Propagación Superficial Frec. 70% Mund.

Δ **Nodular** = + Frec. México + peligroso Maligno 8-12% M

Δ Lentigos-gresivo 5-15% Mund áreas descubiertas

Δ Acral lentiginoso → roba negra Ulcera y Sangre

24-31% en México 8% Mund.

OTROS:

- Hutchinson - No se relaciona a la expo UV

- Desmoplásico 1% lesión exofítica, firme no pigmentada

- De los mucosos 5% mayores de 40 años Cuidad oral nasal

Herpes Virus

HERPES VIRUS

Herpes Virus

Virus

Transmision

Características

• Citomegalovirus VHH5	• Contacto direct • Transmision, trasplante	• Virus mas frecuente de anomalias congenitas
• Virus herpes linfotropo VHH6	• Respiratoria 	• Fam. Roseola virus causa del exantema subitum Roseola tambien se asocia a la ptitosis rosada de Gilbert
• Virus herpes humano 7 VHH7	• Desconocido	

Beta-herpes virus


Carcinoma Basocelular

Epidemiología → Tumor de piel más frecuente.
Puesto - INEN } 75%.

ETIOLOGÍA ⇒ EXPOSICIÓN Solar → Piel expuesta a sol.

A Clínica

↳ CARACOL



[lento
No dolor
Rara metastasis
Difícil de extirparse.

↳ Lugares:

- Frente
- Paredes
- Nariz.

TIPOS → Nodular (+común) - CARA

↳ Superficial → Tronco

Diagnóstico → BIOPSIA (para valorar)

↳ BIOPSIA X EXISIÓN (elección si tumor < 5mm)

Tratamiento → 1 cirugía c/margen de seguridad
2 cirugía micrográfica

Pronóstico → Bueno

[Dermatofitosis]

Agente causal Dermatofitos > hongos filamentosos [Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton]

T. de la piel pilosa

Tiña de la piel lisa

Tiña de uñas

• Tiña de bigote

Tiña barba

Corporis = Co. canis

Capacidad de degradar y utilizar la queratina (escleroproteína)

Definición:

Enfermedad infecc.

Cosmopolita causada

por un grupo de hongos filamentosos con afinidad por la queratina.

Capitis = M. canis (80% sud. Euro)

T. tonsura

Cruris = • T. rubrum

• T. mentagrophytes

Pedis = → Dermatofitos (T. tonsura) animales

Unguim = → Levadura (conclida)

capacidad de invadir y colonizar tejido queratinizado (piel, cabello + uñas) hombre y animales



Rayter

causas de penetrar la piel, cabello uñas.

Dermatofitos que afecta al hombre y a los animales son queratofílicos y por su origen y tropismo

causan la mayor cantidad de infección en el hombre

↓ antropofílicos

↓ zoofílicos

↓ geofílicos

Floccosum: el dermatofito que causa el 80-90 de micosis es T. rubrum

Carcinoma ESPINOCELULAR (CEC)

-> "Epidemiología"

-> Tumor 2do mas frecuente + con metástasis linfático o hemáticas

Factor de riesgo: EXPOSICION Solar, piel blanca, lesión pre-cancerosa (queratosis actina)

↓ TOPOGRAFIA | clinico ↓

Sobre lesiones premalignas o cicatrices, en cara, labios o manos
Usualmente, puede afectar mucosas

Nódulo eritematoso ulcerado
Sangrante o hiperqueratosis con descamación de crecimiento rápido. -> inmunosupresión

Dx = ->

BIOPSIA excisional.

TX = -> Cirugía convencional. o de monhs

↓
Tumor cutáneo en px con trasplante de órgano sólido, leucemia linfático crónico - VIH CEC

Dermatitis atopica

Mayores

- Prurito intenso de predominio nocturno
- morfológica y distribución típica dependiente de la edad
- afectación de cara y superficie extensora en la lactancia y nuca, afectación de superficie en la adolescencia

- * Historia de evolución crónica con exacerbaciones y remisiones
- * Historia familiar o personal de atopia

Menores

- inicio temprano de la enfermedad
 - eczema o palidez facial
 - xerosis
 - ojeros
 - Plegues infraorbitaria
- Factor de riesgo
-> irritantes: jabones
detergentes, Shampoo, jabón
de bebé, jabón y el
quitos
- > infecciones de piel

Diagnóstico:

antecedente de dermatitis visible en otros miembros de la familia

flexos y plegues

-> lactante el 18 meses o con dermatitis en palma y en otros de extensión y sitios de flexión

como en la piel secundaria al prurito - Rasca

- Sangrado
- infección
- Adulteramiento de la piel (agrietado)

* Se sugiere puntual el diagnóstico clínico
DA se clasifica de acuerdo a su gravedad por evolución 30 meses

- Limpia - leve - moderada - grave

