EUDS Mi Universidad

LUXACIONES

Derlin Guadalupe Castillo Gonzalez

Luxaciones

3er parcial

Clínicas quirúrgicas complementarias

Dr. Erick Antonio Flores Gutierrez

Licenciatura en medicina humana

7mo semestre

Grupo "C"

LUXACIONES

DERLIN GUADALUPE CASTILLO GONZALES.

LUIS ANGEL VAZQUEZ RUEDA.

FREDDY IGNACIO LOPEZ GUTIERREZ.

LUXACION

La luxación es una lesión en la cual los extremos de los huesos de una articulación se desplazan fuera de su posición normal, lo que afecta su alineación y funcionamiento.




LUXACION DE HOMBRO

LIGAMENTOS CORACO-CLAVICULARES	INTEGROS	LESIONADOS
LESION	ESGUINCE ACROMIOCLAVICULAR	LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR
GRADO	I: LIGAMENTOS ACROMIOCLAVICULARESPARCIALMENT E LESIONADOS II: LIGAMENTOS ACROMIOCLAVICULARESTOTALMENTE L ESIONADOS	III – VI LESIÓN DE LIGAMENTOSACROMIOCLAVICULARES Y CORACOCLAVICULARES
SIGNOS DE LA TECLA	NO	SI
TX	CONSERVADOR: CABESTRILLOHIELOANALGESICOS	III: QUIRÚRGICO POR MOTIVOSESTETICOS
		IV. V Y VI: QUIRÚRGICO

Lesión: caída sobre el hombro (Ciclistas y motociclistas)

Diagnóstico: Rx AP ambas articulaciones (Desplazamiento

Vertical)Mostrar



GLEOHUMERAL ANTERIOR

IMPORTANTE: MÁS FRECUENTE DE TODAS LAS LUXACIÓNES

CLINCA:

- Hombro doloroso
- Abducción y rotación externa
- Deformidad en Charretera


DX: Radiografía (descartar FX)

LESION NEUROLOGICA: Nervio axilar / Circunflejo

TX:

- Reducción por manipulación cerrada
- Maniobra Kocher, Cooper o Hipócrates modificada
- Inmovilizar con vendaje Velpeau (2-4 semanas) INMOVILIZADOR HOMBRO

Mecanismo de lesión: Rotación externa forzada y abducción del húmero, caida sobre un brazo extendido elevado y la aplicación directa de fuerza en la cara posterior



LUXACION POSTERIOR

> Clínica:

- Hombro doloroso
- Brazo en aproximación
- Rotación interna

Mecanismo:

- Descarga eléctrica
- Convulsión
- Perdida de conocimiento

Radiografía:

- Poco llamativa
- Fractura de troquín
- TC puede confirmarluxación





LUXACION RECIDIVANTE

Origen traumático

- Pacientes jóvenes con primer episodio de luxación por traumatismo importante
- Más joven y mayor energía de traumatismo: Mayor recidiva
- Avulsión del labrum glenoideo y ligamentos glenohumerales

Hombro inestable en dirección antero inferior



Tratamiento quirúrgico: Reparación ligamentaria

LUXACION DE CODO

Mecanismo: Caída sobre la mano, con el codo en extensión

> Clínicamente:

- •Codo en semiflexión y mantiene el miembro lesionado con la otra mano.
- Dolor e impotencia funcional total.

> Tratamiento:

- Reducción
- •Inmovilización férula posterior 2-3 semanas
- Osteosíntesis si se asocia a fractura





LUXACION DE CADERA

- > Mecanismo: Traumatismo de energía.
- Posteriores (90%):
- Miembro inferior acortado
- Rotación interna, aproximación y flexión
- Cabeza femoral "asoma" en región glútea
- > Anteriores (10%):
- Miembro inferior alargado
- Rotación externa y discreta separación
- > Asociada a fractura:
- Cabeza temporal
- Acetábulo
- > Tratamiento:
- Reducción cerrada
- Estabilización con tracción
- Cirugía: fractura asociada





LUXACIÓN DE RODILLA

 La luxación de rodilla es una lesión severa y rara en la que se pierde la alineación de los huesos de la rodilla (fémur y tibia) debido a un trauma directo, como accidentes automovilísticos o caídas.



PUNTOS CLAVE

- Asociada a daño vascular (arteria poplítea) y nervioso (nervio peroneo común).
- Puede ser una emergencia debido al riesgo de compromiso vascular.
- Clasificación según el desplazamiento del fémur y la tibia (anterior, posterior, lateral, medial o rotatoria).
- Frecuentemente involucra ruptura de ligamentos cruzados y colaterales.






TRATAMIENTO

- Urgente: Reducción inmediata en el hospital y evaluación vascular (angiografía si se sospecha daño arterial).
- Inmovilización: Férula o inmovilizador de rodilla temporal.
- Cirugía: Requiere reparación quirúrgica de ligamentos en la mayoría de los casos, seguida de rehabilitación prolongada.



LUXACIÓN DE ROTULA

 Se refiere al desplazamiento de la rótula fuera de su posición habitual, comúnmente hacia el lateral, debido a trauma o movimientos bruscos de torsión.



PUNTOS CLAVE

- Más frecuente en mujeres y en personas con alteraciones anatómicas (torsión tibial, alineación inadecuada de la rótula).
- Puede ser recurrente si no se corrigen los factores predisponentes.
- Provoca dolor, inflamación y limitación del movimiento de la rodilla.



TX

- Reducción: Se puede realizar en urgencias mediante maniobras de extensión de la pierna.
- Inmovilización: Férula en extensión o inmovilizador de rodilla por 2-3 semanas.
- Rehabilitación: Fortalecimiento del cuádriceps, principalmente del vasto medial.
- Cirugía: En luxaciones recurrentes, se pueden realizar procedimientos como la realineación de la rótula o reparación de ligamentos.



LUXACIÓN DE CARPO

 La luxación de los huesos del carpo, especialmente la luxación perilunar y la luxación de escafoides-lunar, ocurre generalmente por un trauma fuerte en la muñeca.



PUNTOS CLAVE

- Frecuente en caídas con la mano en extensión.
- Causa dolor intenso, deformidad y pérdida de función en la muñeca.
- Diagnóstico se confirma con radiografías y puede requerir tomografía o resonancia en casos complejos.



TX

- Reducción cerrada en la mayoría de los casos, bajo sedación o anestesia.
- Inmovilización con férula o yeso durante varias semanas.
- Cirugía: Indicada en luxaciones inestables o en caso de daño asociado a ligamentos y tendones.
- Rehabilitación: Ejercicios para recuperar fuerza y movilidad.



BIBLIOGRAFÍAS

- Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). Proporciona guías clínicas detalladas para el diagnóstico y tratamiento de luxaciones articulares.
- Guidelines for the Management of Acute Traumatic Injuries of the Knee, Patella, and Wrist. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Disponible en AAOS.org.