



Escuela de
**MEDICINA
HUMANA**



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
ESCUELA DE MEDICINA HUMANA**

SALUD PÚBLICA

DRA. FABIOLA LIZBETH ARGUELLO MELO

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ BONIFAZ

1er SEMESTRE

**ACTIVIDAD:
“PROMOCIÓN A LA SALUD”**

BIBLIOGRAFÍA.

- <http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dengue>
- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus/>
- <https://medlineplus.gov/spanish/chikungunya.html>

**“DICHOSO EL QUE ESTUDIA PARA APRENDER, GRANDIOSO EL QUE LO HACE PARA
ENSEÑAR, PERO GLORIOSO EL QUE LO HACE PARA CURAR”**


TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 07/10/2024

TODOS CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA



1

LAVA



Con jabón y cepillo, cubetas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que pueda acumular agua.

2

TAPA



Todo aquel recipiente donde se pueda almacenar agua y no utilices.



3

TIRA

Botes, llantas, cubetas que no utilices, puede ser criadero de mosquitos.

4

VOLTEA



Cubetas, tinas o cualquier otro objeto que acumule agua, los mosquitos lo buscan para su reproducción.

DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

DENGUE

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua.

Los síntomas del dengue, conocido comúnmente como “tracazo” o “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 a 7 días. Se presentan como: Fiebre, Dolor de huesos, Dolor de cabeza intenso (en la frente), Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos), Erupción en la piel (parecida al sarampión), Náuseas, Vómito, Insomnio, Prurito (comezón), Falta de apetito, Dolor abdominal. Y en casos graves: Hemorragia, Convulsiones a causa de la fiebre, Deshidratación severa.

ZIKA

El zika es una enfermedad viral que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados de la especie *Aedes aegypti*. La mayoría de las personas infectadas por el virus de Zika son asintomáticas. Entre quienes presentan síntomas, éstos suelen comenzar entre 3 y 14 días después de la infección, son generalmente leves, por ejemplo, erupciones cutáneas, fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar general y cefaleas, y suelen durar entre 2 y 7 días. Estos síntomas son comunes a otras enfermedades arbovirales y no arbovirales, por lo que el diagnóstico de infección por el virus de Zika requiere confirmación de laboratorio.

CHIKUNGUNYA

El Chikungunya es un virus que es transmitido por los mismos mosquitos que transmiten el Dengue y el Zika. El virus se puede propagar de la persona embarazada a su bebé al momento del nacimiento. También es posible la propagación a través del contacto con sangre infectada. La mayoría de las personas que tienen chikungunya presentan síntomas, los cuales pueden ser graves. Suelen comenzar de tres a siete días después de la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor en las articulaciones. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón de las articulaciones y sarpullido.