

ESCALA DE TANNER

ALUMNA: DAIRA LLAVE NAVARRO AGUILAR

DOCENTE: DR. AXEL GUADALUPE

MATERIA: ANTROPOLOGIA

CAMPUS: BERRIOZABAL-TUXTLA GUTIERREZ

Bibliografía

<https://cdn.adolescenciasema.org/usuario/documento/A4>

Escala de desarrollo sexual de Tanner

la pubertad es la etapa de transición que ocurre de la niñez para terminar en una madurez reproductiva. Aquí ocurren una serie de procesos y cambios fisiológicos y morfológicos que permiten alcanzar la capacidad de reproducción. Más adelante el niño va experimentando cambios somáticos y psicológicos que progresan, hasta que alcanza la talla adulta, madurez psicosocial y la fertilidad.

La escala de Tanner describe los cambios físicos observables a través de la pubertad: genitales, vello púbico, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Divididos en 5 estadios, presentando dos escalas, una para las niñas y otra para los niños.

Figura 3. Escalas de Tanner en niños.



Estadio 1. Sin vello púbico. Testículos y pene infantiles.



Estadio 2. Aumento del escroto y testículos, piel del escroto enrojecida y arrugada, pene infantil. Vello púbico escaso en la base del pene.



Estadio 3. Alargamiento y engrosamiento del pene. Aumento de testículos y escroto. Vello sobre pubis rizado, grueso y oscuro.



Estadio 4. Ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos, aumento y oscurecimiento del escroto. Vello púbico adulto que no cubre los muslos.

Estadio 5. Genitales adultos. Vello adulto que se extiende a zona medial de muslos.

Tomado de Tanner 1962.

Figura 2. Escalas de Tanner en niñas.



Estadio 1. Pecho infantil, no vello púbico.



Estadio 2. Botón mamario, vello púbico no rizado escaso, en labios mayores.



Estadio 3. Aumento y elevación de pecho y areola. Vello rizado, basto y oscuro sobre pubis.



Estadio 4. Areola y pezón sobreelevado sobre mama. Vello púbico tipo adulto no sobre muslos.



Estadio 5. Pecho adulto, areola no sobreelevada. Vello adulto zona medial muslo.

Tomado de Tanner 1962.