



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
LICENCIATURA MEDICINA HUMANA  
CAMPUS COMITÁN



TABLA COMPARATIVA FÁRMACOS UTEROTONICOS

MATERIA: GINECOLOGIA

DRA. THANIA GUILLEN

7° A

ALUMNO: CARLOS OMAR JACOB VELAZQUEZ

COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIS. 07 DICIEMBRE DEL 2024

FÁRMACOS	MECANISMO DE ACCIÓN	PRESENTACIÓN	DOSIS	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES
Oxitocina	LA OXITOCINA INCREMENTA LA PERMEABILIDAD DE LAS MIOFIBRILLAS UTERINAS AL SODIO, ESTIMULANDO INDIRECTAMENTE LA CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO LISO UTERINO.	INYECTABLE 5 UI CONTIENE 100 AMPOLLAS  SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA DE CARTÓN CON 5 O 50 AMPOLLETAS DE 1ML CON 5 UI CADA UNA	VÍA IM 3-10 UI CESÁREA: 5 UI POR IM O POR IV PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA UTERINA DURANTE EL POSPARTO: 5 O 10 UI POR IV LENTA	ARRITMIA CARDIACA, BRADICARDIA FETAL, CONTRACCIÓN VENTRICULAR PREMATURA	TOXEMIA SEVERA, MALA POSICIÓN FETAL, HIPERTONÍA UTERINA, CICATRIZ UTERINA, PLACENTA PREVIA.
Ergonovina	ES UNA DROGA ANTISEROTONINÉRGICA ACTÚA SOBRE EL SNC Y ESTIMULA DIRECTAMENTE EL MÚSCULO LISO.	CAJA CON 20 TABLETAS  INYECTABLE CAJA CON 2 Y 100 AMPOLLAS DE 1 ML	VO TABLETAS 1 – 2 CADA 6 HORAS.  VÍA IM/IV 0.2 MG (1ML) CADA 6 HORAS	NÁUSEAS, VÓMITOS, CEFALEA SÚBITA, PRURITO.	AMENAZA DE ABORTO, INDUCCIÓN AL PARTO, DISFUNCIÓN HEPÁTICA, HIPERTENSIÓN SEVERA.
Carbetocina	LA CARBETOCINA SE UNE EN FORMA SELECTIVA A LOS RECEPTORES DE LA OXITOCINA EN EL MÚSCULO LISO DEL ÚTERO	CAJA CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML  CAJA CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML	VÍA IV O IM ADMINISTRAR 1ML DOSIS ÚNICA	CEFALEA, TEMBLORES, VÉRTIGO, HIPERTENSIÓN, ENROJECIMIENTO, NAUSEA, DOLOR ABDOMINAL, PRURITO	HIPERSENSIBILIDAD, DURANTE EL EMBARAZO Y EN EL PARTO ANTES DE LA SALIDA DEL PRODUCTO, TRASTORNOS CARDIOVASCULARES
Misoprostol	ESTIMULA CONTRACCIONES UTERINAS FUERTES QUE PROVOCAN CÓLICOS Y SANGRADO. TAMBIÉN MADURA, DILATA Y REBLANDECE EL CUELLO UTERINO, LO QUE PERMITE QUE SE INTERCALE MÁS AGUA ENTRE LAS FIBRAS DE COLÁGENO	CAJA CON FRASCO CON 2 O 28 TABLETAS DE 200 MCG <b>CAJA CON BLÍSTER CON</b> 28, 30, 60, 90 Y 100 TABLETAS.	<b>Inducción del parto</b> Misoprostol 25-50 µG cada 4 horas PV o misoprostol 50-100 µG cada 2 horas VO <b>Profilaxis de la hemorragia posparto (HPP)</b> Misoprostol 600 µG SL única dosis.	DIARREA, DOLOR ABDOMINAL, DISPEPSIA, NAUSEAS, VOMITO	HIPERSENSIBILIDAD A LAS PROSTGLANDINAS, MUJERES EMBARAZADAS, SUFRIMIENTO FETAL, MULTIPARAS