



**ALUMNO(A): ESTRELLA ALEJANDRINA NIEVES
OVIEDO**

TEMA: CUESTIONARIO Y RESUMEN

3ER PARCIAL

PROFESOR(A): DR GUILLERMO DEL SOLAR

MATERIA: BIOQUIMICA

1ER SEMESTRE

GRUPO: "B"

Cuestionario de funciones de las proteínas

1. ¿Cuál es la principal función de una enzima?

a) Transportar oxígeno

b) Actuar como catalizador de reacciones

c) Almacenar energía

d) Regular el pH

2. ¿Qué término se utiliza para referirse a una molécula que se une de manera reversible a una proteína?

a) Enzima

b) Cofactor

c) Ligando

d) Sustrato

3. ¿Dónde se une el oxígeno en las proteínas transportadoras?

a) Sitio activo

b) Grupo fosfato

c) Grupo hemo

d) Residuo aminoácido

4. ¿Qué función tienen las globinas en los organismos?

a) Almacenar glucosa

b) Transportar o almacenar oxígeno

c) Romper lípidos

d) Actuar en la digestión

5. ¿Cuál de las siguientes proteínas es monomérica y facilita la difusión de oxígeno en el tejido muscular?

a) Hemoglobina

b) Citoglobina

c) Neuroglobina

d) Mioglobina

6. ¿Qué característica le permite a la mioglobina almacenar oxígeno?

a) Estructura cuaternaria

- b) Curva hiperbólica de unión al oxígeno
- c) Ser una proteína alostérica
- d) Estar en el torrente circulatorio

7. ¿Qué componente evita que el hierro en el grupo hemo se convierta al estado férrico (Fe^{3+})?

- a) El anillo de porfirina

b) Los átomos de nitrógeno coordinados

- c) Los enlaces disulfuro
- d) La histidina proximal

8. ¿Qué tipo de proteína es la hemoglobina?

- a) Monomérica

b) Tetramérica

- c) Dimérica
- d) Pentamérica

9. ¿En qué tipo de células se encuentra principalmente la hemoglobina?

a) Eritrocitos

- b) Plaquetas
- c) Linfocitos
- d) Macrófagos

10. ¿Cuál es la función de la neuroglobina?

- a) Transporte de oxígeno en la sangre

b) Protección del cerebro contra la hipoxia

- c) Regulación del pH
- d) Almacenamiento de energía

11. ¿Qué nombre reciben las estructuras que conectan los segmentos helicoidales en la mioglobina?

- a) Hélices α
- b) Puentes de hidrógeno
- c) Giros

d) Segmentos AB

12. La mioglobina tiene un peso molecular de aproximadamente:

a) 12,000 Da

b) 16,700 Da

c) 24,000 Da

d) 32,500 Da

13. ¿Cuál es la función principal de la histidina distal en la mioglobina?

a) Actuar como ligando

b) Estabilizar el complejo Fe-O₂

c) Transportar CO₂

d) Facilitar la hidrólisis del ATP

14. La hemoglobina es un ejemplo de proteína:

a) Monomérica

b) Alostérica

c) Fibrosa

d) Enzimática

15. ¿Qué porcentaje de oxígeno se libera en promedio de la hemoglobina a los tejidos?

a) 10%

b) 25%

c) 33%

d) 50%

16. ¿Qué efecto produce el 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) en la hemoglobina?

a) Aumenta la afinidad por el oxígeno

b) Disminuye la afinidad por el oxígeno

c) Inhibe la unión de CO₂

d) Estabiliza el estado R

17. ¿En qué condición aumenta la concentración de BPG?

a) A bajas altitudes

b) En condiciones de hipoxia

- c) En el pH elevado
- d) En presencia de monóxido de carbono

18. ¿Qué clase de proteína es IgG?

a) Enzima

b) Inmunoglobulina

- c) Hormona
- d) Neurotransmisor

19. ¿Cuál es el principal anticuerpo en la respuesta inmune secundaria?

a) IgA

b) IgD

c) IgE

d) IgG

20. Las proteínas motoras como las quinesinas se mueven sobre:

a) Microfilamentos

b) Microtúbulos

c) Ribosomas

d) Mitocondrias

21. ¿Cuál es la principal proteína involucrada en la contracción muscular?

a) Tropomiosina

b) Actina

c) Tubulina

d) Quinesina

22. ¿Qué nombre recibe la estructura básica de la contracción muscular?

a) Miofibrilla

b) Sarcómero

c) Actomiosina

d) Línea M

23. ¿Qué proteína actúa como “regla molecular” en el músculo?

- a) Actina
- b) Miosina
- c) Titina

d) Nebulina

24. El sarcómero es la unidad contráctil que se encuentra entre:

a) Bandas I

b) Discos Z

c) Filamentos gruesos

d) Mitocondrias

25. ¿Qué proteína regula la disponibilidad de los sitios de unión de miosina en la actina?

a) Tropomiosina

b) Troponina

c) Titina

d) Nebulina

26. ¿Qué ocurre durante el “golpe de fuerza” en la contracción muscular?

a) La actina se libera de la miosina

b) La cabeza de miosina vuelve a su posición original

c) Se hidroliza el ATP

d) Se une ADP a la miosina

27. ¿Cuál es la principal función del efecto Bohr en la hemoglobina?

a) Facilitar la unión de BPG

b) Regular la liberación de oxígeno según el pH y CO₂

c) Aumentar la unión de H⁺ en los pulmones

d) Almacenar CO₂

28. ¿Qué tipo de proteína es un anticuerpo?

a) Catalítica

b) Transportadora

c) De defensa

d) Estructural

29. La estructura de las IgG se asemeja a:

a) Una cruz

b) Una esfera

c) Una Y

d) Una hélice

30. ¿Cómo se llama la parte de IgG que se une al antígeno?

a) Fc

b) Fab

c) Variable

d) Ligando

31. ¿Qué proteína transporta CO₂ como carbamato?

a) Mioglobina

b) Neuroglobina

c) Hemoglobina

d) Albumina

32. Las proteínas motoras dependen principalmente de la energía de:

a) ADP

b) GTP

c) ATP

d) Fosfato

33. ¿Qué proteína se une al calcio en el músculo esquelético?

a) Troponina

b) Tropomiosina

c) Titina

d) Nebulina

34. ¿Qué motor molecular es clave en el movimiento de cilios y flagelos?

a) Miosina

b) Dineína

c) Helicasa

d) Actina

35. ¿Dónde se encuentran las quinesinas principalmente?

a) Microtúbulos

b) Filamentos intermedios

c) Sarcómeros

d) Núcleo

36. ¿Qué célula produce anticuerpos?

a) Macrófago

b) Linfocito B

c) Neutrófilo

d) Linfocito T

37. La histidina distal en la hemoglobina ayuda a:

a) Disminuir la afinidad por el CO

b) Aumentar la afinidad por el CO

c) Catalizar la producción de ATP

d) Transportar glucosa

38. ¿Qué proceso involucra la nebulina y la titina?

a) Transporte de oxígeno

b) Contracción muscular

c) Interacción proteína-ligando

d) Reparación celular

39. ¿Qué factor estimula la liberación de oxígeno en los tejidos?

a) Alta concentración de oxígeno

b) pH bajo

c) Saturación de hemoglobina

d) Concentración de BPG baja

40. ¿Cuál es la estructura principal de los anticuerpos IgG?

a) Cuatro cadenas pesadas

b) Dos cadenas ligeras y dos pesadas

c) Tres cadenas ligeras

d) Una sola cadena polipeptídica



Zet Parcun

FUNCION DE LAS PROTEINAS

RESUMEN

Las proteínas funcionan mediante la interacción con otras moléculas. La función de varias proteínas implican la unión reversible de otras moléculas. Una molécula unida de manera reversible por una proteína se conoce con el nombre de ligando.

Un ligando puede ser cualquier tipo de molécula. Un ligando se une a un lugar de la proteína llamado sitio de fijación, que es complementario al ligando en tamaño, forma, carga y carácter, hidrofóbico o hidrofílico. Las proteínas son flexibles, en su conformación pueden ser sutiles. La adaptación estructural que se produce entre la proteína y el ligando se llama encaje inducido.

Las moléculas sobre las que actúan las enzimas se llaman sustratos de la reacción en vez de ligandos, y el sitio de fijación de lig. se llama sitio catalítico o sitio activo. La mioglobina o hemoglobina son posiblemente 2 proteínas mejor conocidas por su unión reversible de un ligando a una proteína.

El hierro suele ser incorporado a un grupo prostético unido a una proteína llamado grupo hemo. Este grupo hemo tiene una estruct. de anillo orgánico complejo, la protoporfirina a la que está unido un único átomo de hierro en su estado ferroso.

Las globinas son una familia de proteínas de unión de oxígeno, la mioglobina tiene un sitio de fijación para el oxígeno, también facilita la difusión de oxígeno en el tejido muscular.

La mioglobina es un polipéptido simple de 153 residuos aminoácidos con una molécula de hemo.



El término alostérico son aquellas que tienen otras conformaciones o formas inducidas por la unión de ligandos conocidos como moduladores. Y cuando el ligando normal y el modulador son idénticos la interacción se denomina homotrópica. Cuando el modulador es una molécula diferente del ligando normal la interacción es heterotrópica. Existen 2 modelos que explican los mecanismos de la unión cooperativa.

1er modelo se considera que las subunidades de una proteína con unión cooperativa son funcionalmente idénticas, que cada subunidad puede existir en 2 conformaciones y que todas las subunidades sufren la transición de una conformación de manera simultánea.

2do modelo, dice que, la unión del ligando puede inducir un cambio de conformación de una subunidad individual.

La hemoglobina transporta H^+ y CO_2

Las proteínas del músculo son la miosina y la actina.

Los anticuerpos poseen dos lugares idénticos de unión a antígenos.

Las enzimas catalizan reacciones químicas en el organismo.