

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**ALUMNO(A): ESTRELLA ALEJANDRINA**

**NIEVES OVIEDO**

**TEMA: ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS**

**4TO PARCIAL**

**MAESTRO(A): DR FELIX CHANG CHONG**

**MATERIA: ANTROPOLOGIA**

**IER SEMESTRE**

**GRUPO "B"**

# DENGUE

## DEFINICION

ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA VIRAL, SISTEMATICA Y DINAMICA TRANSMITIDA POR EL VECTOR "AEDES AEGYPTI" Y "AEDES ALBOPICTUS" Y CAUSADA POR EL VIRUS FLAVIVIRIDAE

## PERIODO DE INCUBACION

DE 2 A 7 DIAS QUE SE PRESENTA EN CLIMAS TROPICALES Y SUBTROPICALES Y ZONAS URBANAS

## PERIODO DE CONTAGIO

LAS PERSONAS PUEDEN INFECTAR A LOS MOSQUITOS DESDE 2 DIAS ANTES DE LA APARICION DE LOS SINTOMAS Y HASTA 5 DIAS DESPUES DE QUE COMIENCEN

## SIGNOS Y SINTOMAS

- FIEBRE ALTA
- DOLOR DE CABEZA
- DOLOR DETRÁS DE LOS OJOS
- DOLOR MUSCULAR Y EN LAS ARTICULACIONES.
- NÁUSEAS Y VÓMITOS
- DEBILIDAD Y CANSANCIO GENERALIZADO

## DIAGNOSTICO

- PRUEBAS:
- DE SANGRE
  - MOLECULAR
  - DE ANTIGENOS DE ANTICUERPOS

## TRATAMIENTO

- TEMPRERA
- PARACETAMOL

**NO DAR;:**

- ASPIRINA
- IBUPROFENO
- KEROTOLAGO

(AUMENTA EL SANGRADO O LO PROVOCA)

# SARAMPIÓN

## DEFINICION

ES UNA ENFERMEDAD FÉBRIL EXANTEMÁTICA AGUDA PRODUCIDA POR EL VIRUS DE SARAMPIÓN. ES CARACTERIZADA POR UN PERIODO PRODRÓMICO FÉBRIL CON MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS Y UN ENANTEMA ESPECÍFICO, SEGUIDO CON UNA ERUPCIÓN MACUPAPULOSA GENERALIZADA

## PERIODO DE INCUBACION

DE 10 DÍAS LAS INFECCIONES OCURREN A FINALES DE INVIERNO Y A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

## PERIODO DE CONTAGIO

3 DÍAS ANTES HASTA LOS 5 DÍAS DE SU APARICIÓN SU TRANSMISIÓN MAS COMUN ES POR LAS GOTAS AL TOSER (FLUSH)

## SIGNOS Y SINTOMAS

- FIEBRE
- MALESTAR GENERAL
- CATARRO
- TOS
- MANCHAS DE KOPLIK
- LINEAS DE STIMSON

## DIAGNOSTICO

- EXAMENES DE LABORATORIO
- MUESTRA DE SANGRE VENOSA
- ANTICUERPOS IgM

## TRATAMIENTO

- ASINTOMÁTICO
- ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A (200 U POR DÍA)
- LÍQUIDOS Y NUTRIENTES

# RUBEÓLA

## DEFINICION

ES UNA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA DE ORIGEN VIRAL CAUSADA POR UN TOGAVIRUS DEL GENERO RUBIVIRUS Y ES LA 3RA ENFERMEDAD

## PERIODO DE INCUBACION

12 A 23 DIAS Y ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ANOMALIAS CONGENITAS PREVENIBLES MEDIANTE LA VACUNACION

## PERIODO DE CONTAGIO

7 DIAS DE LA ERUPCION HASTA 7 DIAS PREVIOS DE LA ERUPCION Y SU PRINCIPAL TRANSMICION SON LAS GOTAS AL TOSER (FLUSH)

## SIGNOS Y SINTOMAS

- FASE PRODRÓMICA:
- FIEBRE (39°C)
  - NAUSEAS
  - CONJUNTIVITIS Y CUADRO CATARRAL ANTES DE LAS ERUPCIONES
  - MANCHAS DE FORCHEIRMMER
  - SIGNO DE TEODOR

## DIAGNOSTICO

- EXAMENES DE LABORATORIO
- MUESTRA DE SANGRE VENOSA

## TRATAMIENTO

- ASINTOMATICO
- BAÑO DIARIO CON AGUA TIBIA SIN TALLAR LA PIEL

# VARICELA

## DEFINICION

ES UNA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA PRODUCIDA POR ALGUNO DE LOS 18 GENOTIPOS DEL VIRUS DE LA VARICELA ZOSTER, QUE PERTENECE A LA FAMILIA ALFA HERPES VIRUS (HERPES TIPO 3)

## PERIODO DE INCUBACION

10 A 21 DIAS ANTES DE LA APARICION DEL EXANTEMA TAMBIEN CONOCIDA COMO CHICKENPOX

## PERIODO DE CONTAGIO

2 DIAS ANTES DEL EXANTEMA Y TERMINA HASTA LA FASE DE LAS COSTRAS TAMBIEN REAPARECE EN FORMA DE HERPES ZOSTER

## SIGNOS Y SINTOMAS

- FASE PRODRÓMICA:  
INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE:
- MIALGIAS, ARTRALGIAS, FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL Y ESCALOFRIOS
- FASE EXANTÉMICA:  
DESPUES DE 24 A 48 HRRS
- EXANTEMA "MACULO PAPULAR"
- ACOMPAÑADO DE: VESICULAS, PUSTULAS Y COSTRAS

## DIAGNOSTICO

- DX CONFIRMADO:  
TINCION DE TZANCK
- EMBARAXADAS O INMUNOCOMPR ENDIDAS:PCR

## TRATAMIENTO

- BAÑOS COLOIDES
- CREMAS EMOLIENTES (CALAMINA)
- SINTOMATICOS: PARACETAMOL
- EN COMPLICACIONES: ACICLOVIR O VALANCICLOVIR

# ERITEMA INFECCIOSO

## DEFINICION

EL ERITEMA INFECCIOSO ES UNA INFECCIÓN VÍRICA CONTAGIOSA. EN LOS NIÑOS, CAUSA UNA ERUPCIÓN ROJA MANCHADA O ELEVADA EN ÁREAS DEL CUERPO Y UNA ERUPCIÓN ROJA EN LA MEJILLA, LO QUE SE LLAMA "MEJILLA ABOFETEADA". EN UN FETO, PUEDE SER MORTAL. ES LA 5ª ENFERMEDAD

## PERIODO DE INCUBACION

4 A 21 DIAS  
Y PREDOMINA  
DURANTE LOS  
MESES DE  
PRIMAVERA-  
VERANO

## PERIODO DE CONTAGIO

6 A 11 DIAS PREVIOS  
AL EXANTEMA Y SE  
TRANSMITE ATRAVES  
DE INHALACION DE  
AEROSOLES O  
SECRECIONES DE LA  
PERSONA INFECTADA  
O TRANSFUSION  
SANGUINEA Y  
VERTICAL

## SIGNOS Y SINTOMAS

1ER ETAPA:  
EXANTEMA  
ERITEMATOSO "MEJILLA  
ABOFETEADA"  
2DA ETAPA:  
EXANTEMA PAPULAR  
DISTAL Y SIMÉTRICO EN  
EL TRONCO Y LAS  
PIERNAS  
3ER ETAPA:  
ERUPCION RECURRENTE  
"SIGNO DE LA PLAYA"

## DIAGNOSTICO

- IgM
- PCR

## TRATAMIENTO

- MEDIDAS GENERALES  
(ASINTOMATICO)

# ROSEÓLA

## DEFINICION

ES UNA ENFERMEDAD VIRAL QUE TRAE COMO CONSECUENCIA UN EXANTEMA VIRAL. TAMBIEN LLAMADA INFANTUM Y LA 6TA ENFERMEDAD. ES CAUSADA POR MAS DE UN VIRUS, PERO LA MAS COMUN ES EL VIRUS DEL HERPES 6 Y 7

## PERIODO DE INCUBACION

5 A 15 DIAS

## PERIODO DE CONTAGIO

ANTES QUE APAREZCA EL SARPULLIDO Y MIENTRAS ESTÉ EL EXANTEMA Y SE CONTAGIA MEDIANTE GOTAS DE LIQUIDO DE LA NARIZ, TOSEN O ESTORNUDAN

## SIGNOS Y SINTOMAS

- IRRITABILIDAD
- INFLAMACION EN PÁRPADOS
- SARPULLIDO ROSADO EN TORSO CUELLO Y BRAZOS
- APETITO DISMINUIDO

## DIAGNOSTICO

- ANALISIS DE SANGRE
- EXAMEN FISICO

## TRATAMIENTO

- PARACETAMOL
- IBUPROFENO

- NO DAR:
- ASPIRINA
- DEBIDO A QUE CAUSA EL SINDROME DE REYE