



**NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ANTROPOLOGIA MEDICA I**

**NOMBRE DEL TEMA: ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS**

**NOMBRE DEL PROFESOR: CHANG CHONG FELIX**

**NOMBRE DEL ALUMNO: YIRHE DAVID DIAZ MORENO**

**SEMESTRE Y GRUPO: 1 "B"**




## Definición

Es una enfermedad infecciosa viral dengue virus con 4 serotipos 1, 2, 3, y 4 sistémica y dinámica transmitida por el vector aedes aegypti

## Periodo de incubación y de contagio

- Periodo de incubación de 2 a 7 días.
- La transmisión de seres humanos a mosquitos puede ocurrir desde 2 días antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad y hasta 2 días después de la resolución de la fiebre.



# DENGUE

## Signos y síntomas

Personas que han viajado en una zona tropical que solo han tenido fiebre y empiezan con el dolor del cuerpo y dolor de ojos náuseas vómitos o prurito

## Tratamiento

Paracetamol y tempra-paracetamol para los niños

## Diagnostico


- Pruebo molecular
- prueba de antígenos
- prueba de anticuerpos

## Definición

Es una enfermedad febril exantemática aguda muy contagiosa producida por el virus del sarampión caracterizada por un periodo prodrómico febril con manifestación respiratorias y una enantema específico seguido de una erupción maculopapulosa generalizada

## Periodo de incubación y de contagio

- Periodo de incubación de 10 días.
- período de contagio 3 días antes del exantema hasta los 5 días de su aparición.



# SARAMPIÓN

## Signos y síntomas

- Los síntomas fiebre
- malestar general
- catarro
- manchas de cokoplin
- líneas de stimson

## Tratamiento

Se recomienda la administración de vitamina A o 200,000 VI por dos días

## Diagnostico


Exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico de sarampión se le recomienda tomar una muestra de sangre venosa para la detección anticuerpos

## Definición

Es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por togavirus de género rivirus

## Periodo de incubación y de contagio

- Periodo de incubación 12 a 23 días
- periodo de contagio de 7 días previos de erupción hasta 7 días



# RUBEOLA

## Signos y síntomas

- Fiebre
- náuseas con conjuntivitis leve y cuadro catarral
- manchas de forcheirmmmes
- signo de teodor

## Tratamiento

Baño diario con agua tibia sin tallar la piel

## Diagnostico



Exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico de Rubeola se le recomienda tomar una muestra de sangre venosa para la detección anticuerpos

## Definición

Enfermedad infecto contagiosa producida por algunos de los 18 genotipos del virus de la varicela zoster que pertenece a la familia alfa Herpes virus

## Periodo de incubación y de contagio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Scelerisque viverra mauris in aliquam sem fringilla ut.



## Tratamiento

Tratamiento con inmunodeficiencias y esteroides

## Diagnostico

Tiempo de exposición para adquirir la varicela aparecer al niño de 60 minutos con exposición mi cara personal de salud más de 15 minutos cara a cara o 60 minutos en la misma habitación DX confirmado tensión de teack

## Signos y síntomas


- Período de incubación 10 a 21 días antes de la aparición del examen
- período de contagio 2 días antes del exantema y termina hasta la fase de costras

## Definición

Es una infección viral que comúnmente afecta a los bebés y a los niños pequeños implica fiebre alta y una erupción cutánea entre rosácea y roja

## Periodo de incubación y de contagio

- período de incubación es de 5 a 15 días.



# 5 ENFERMEDAD

## Signos y síntomas

Los síntomas incluyen fiebre alta durante varios días, seguida de un sarpullido, el sarpullido puede manifestarse como varias manchas pequeñas y rosadas.

## Tratamiento

Paracetamol (acetaminofeno) o ibuprofeno para la fiebre (para proporcionar el bienestar)

## Diagnostico


La roséola se diagnostica evaluando el historial médico del paciente y realizando un examen físico.

## Definición

La escarlatina es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria estreptococo del grupo A

## Periodo de incubación y de contagio

- Periodo de incubación es de 1 a 7 días
- El período de contagio se transmite a través de gotitas de saliva en una persona contagiada



# 6 ENFERMEDAD

## Signos y síntomas

Los síntomas incluyen un sarpullido rojo intenso que cubre la mayor parte del cuerpo, dolor de garganta y fiebre alta.

## Tratamiento

La fiebre escarlata se trata con antibióticos como Penicilina y Analgésico.

## Diagnostico

La escarlatina se diagnostica mediante un examen físico, un cultivo de garganta y una prueba rápida de estreptococos