



Mi Universidad

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Antropología Médica I

NOMBRE DEL DOCENTE: Felix Chang Chong

NOMBRE DEL ALUMNO: Dulce María Molina Guzmán

PARCIAL: 4to

DENGUE

```
graph TD; D[DENGUE] --- DEF[DEFINICIÓN]; D --- INC[P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO]; D --- SIG[SIGNOS Y SÍNTOMAS]; D --- DIA[DIAGNÓSTICO]; D --- TRA[TRATAMIENTO];
```

DEFINICIÓN

Es una enfermedad viral, dengue virus con cuatro serotipos, sistemática, dinámica transmitida por el vector *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 2 a 7 días

Período de contagio : entre 2 días antes de que aparezcan los síntomas y hasta 5 días después de que comiencen

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Síntomas: Fiebre elevada (40°C/104° f), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articulares, náuseas

DIAGNÓSTICO

- Prueba de sangre (hemoglobina) completa.
- Prueba molecular (PCR)
- Prueba de antígenos (NS1)
- Prueba de anticuerpos ISG E IMG

TRATAMIENTO

Puede tratarse en el domicilio con medicamentos que alivien el dolor.

SARAMPIÓN

DEFINICIÓN

Es una enfermedad febril (EFE) aguda muy contagiosa, producida por el virus del sarampión.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 10 días

Período de contagio : En el 3 día antes del exantema hasta los 5 días después de la aparición.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Fiebre elevada
- Malestar general
- Catarro (lagrimeo)
- Tos
- Manchas de koplik
- Línea de stimson


DIAGNÓSTICO

- Examen de laboratorio

TRATAMIENTO

- Asintomática
- Se recomienda la adquisición de vitaminas A
- Aporte adecuado de líquido y nutrientes

RUBEOLA



```
graph TD; RUBEOLA --> DEFINICIÓN; RUBEOLA --> P[PERÍODO DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO]; RUBEOLA --> SIGNOS_Y_SÍNTOMAS; RUBEOLA --> DIAGNÓSTICO; RUBEOLA --> TRATAMIENTO;
```

DEFINICIÓN

Es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por un togavirus do género rubivirus.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 12 a 23 días

Período de contagio : 7 días previos de la erupción.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Fiebre >39°C
- Conjuntivitis leve
- Cuadro catarral
- Manchas de forcheimer
- Signo de teodor

DIAGNÓSTICO

- Examen de laboratorio (muestra de sangre venosa para la detención de anticuerpos igm)

TRATAMIENTO

- Asintomático
- Baño diario con agua tibia sin tallar la piel

VARICELA

DEFINICIÓN

Es una enfermedad infecto-contagiosa producida por algunos de los 18 genotipos del virus de la varicela zóster, que pertenece a la familia Alfa herpes virus (herpes tipo 3).

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 10 a 21 días antes de la aparición de exantemas

Período de contagio : 2 días antes del contagio y termina en costras.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Infección de vías respiratorias
- Mialgias
- Artralgias
- Fiebre
- Dolor abdominal
- Escalofríos

DIAGNÓSTICO

- Dx confirmatorio
- PCR
- Tiempo de exposición

TRATAMIENTO

- Higiene
- Baño con colorante
- Cremas emolientes
- Sintomáticos

ERITEMA INFECCIOSO

```
graph TD; A[ERITEMA INFECCIOSO] --- B[DEFINICIÓN]; A --- C[P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO]; A --- D[SIGNOS Y SÍNTOMAS]; A --- E[DIAGNÓSTICO]; A --- F[TRATAMIENTO];
```

DEFINICIÓN

Es una infección viral común de la infancia, causada por el parvovirus B19.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 4 a 21 días

Período de contagio : De 6 a 11 días previos al exantema.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Primera etapa: Mejillas abofeteadas
- Segunda etapa: Exantema en encaje
- Tercera etapa: Erupción recurrente hasta por varios días

DIAGNÓSTICO

- IGM
- PCR

TRATAMIENTO

- Medidas generales
- Sintomaticos

ROSEOLA

```
graph TD; A[ROSEOLA] --- B[DEFINICIÓN]; A --- C[P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO]; A --- D[SIGNOS Y SÍNTOMAS]; A --- E[DIAGNÓSTICO]; A --- F[TRATAMIENTO];
```

DEFINICIÓN

Suele afectar a los niños hasta los 2 años, es causada por un virus que se transmite de una persona a otra.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 5 a 15 días

Período de contagio : Durante la fiebre y deja serlo cuando ella desaparece

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Fiebre
- Sarpullido
- Irritabilidad
- Diarrea leve
- Párpados hinchados
- Disminución del apetito

DIAGNÓSTICO

- Cuando aparece la fiebre y empiezan a salir las erupciones

TRATAMIENTO

- Cuidado personal
- Analgésico
- Reemplazo de fluidos

ESCARLATINA

DEFINICIÓN

Es una enfermedad bacteriana que se manifiesta en algunas personas que tienen faringitis estreptococcia.

P. DE INCUBACIÓN Y P. DE CONTAGIO

Período de incubación: De 1 a 7 días

Período de contagio: De 12 a 24 horas

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Erupción cutánea
- Línea de color rojo
- Cara ruborizada
- Lengua de fresa

DIAGNÓSTICO

- Examen físico
- Pedir un cultivo de garganta para detectar bacterias de estreptococo
- Solicitar una prueba rapida para detectar estereotipos del grupo A

TRATAMIENTO

- Abundantes líquidos
- Resposo durante el periodo febril
- Analgésicos y antitermicos
- Analgésicos