



**NOMBRE DEL ALUMNO:
ROSEMBERG ENRIQUE ARGÜELLO MERIDA**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD DOS**

**NOMBRE DE LA MATERIA:
PSICOPATOLOGIA II**

**NOMBRE DEL DOCENTE:
LIC. MARIA DEL CARMEN BRIONES MARTINEZ**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA:
PSICOLOGIA SÉPTIMO CUATRIMESTRE**

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Condición en la que una persona experimenta una ansiedad excesiva cuando se separa de las personas a las que está apegada.

El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos.

MUTISMO SELECTIVO

Una persona, generalmente un niño, es incapaz de hablar en ciertos contextos sociales donde se espera que hable, como en la escuela, a pesar de poder hablar en otros contextos, como en casa. Este trastorno puede interferir significativamente con la vida social, académica y laboral de la persona.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS

FOBIA ESPECÍFICA

La persona experimenta miedo intenso y persistente a un objeto o situación particular que generalmente no representa un peligro real. Generalmente estas fobias se inician porque el sujeto ha reaccionado con miedo ante la situación fóbica, bien porque no sabía cómo afrontarla o bien porque ya la temía debido al testimonio de personas relevantes.

Trastorno de Pánico

Caracterizado por ataques de pánico recurrentes e inesperados. Estos ataques son episodios de miedo intenso que pueden incluir síntomas físicos y emocionales.

FOBIA SOCIAL

Caracterizado por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de desempeño en las que la persona teme ser juzgada, avergonzada o humillada.

TRASTORNO DE PÁNICO

Caracterizado por ataques de pánico recurrentes e inesperados. Estos ataques son episodios de miedo intenso que pueden incluir síntomas físicos y emocionales que pueden durar varios minutos.

La persona que los padece tiene el miedo constante de volver a sufrir futuros ataques al igual que la tendencia de evitar lugares y situaciones donde ha experimentado ataques de pánico.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Caracterizado por una preocupación y ansiedad excesivas y persistentes sobre diversos aspectos de la vida diaria, sin una causa aparente que justifique este nivel de preocupación.

La persona que lo padece tiene dificultad para controlar sus preocupaciones, dificultad para concentrarse, mente en blanco, y sensación de estar al límite. Los síntomas físicos son fatiga, problemas de sueño, tensión muscular, temblores, sudoración, náuseas, y problemas gastrointestinales.

MUTISMO SELECTIVO

Una persona, generalmente un niño, es incapaz de hablar en ciertos contextos sociales donde se espera que hable, como en la escuela, a pesar de poder hablar en otros contextos, como en casa. Este trastorno puede interferir significativamente con la vida social, académica y laboral de la persona.

TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.

OTRO TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS

TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA

Es un trastorno mental caracterizado por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos que controlan el comportamiento de la persona de manera alternada. Este trastorno suele estar asociado con experiencias traumáticas severas, especialmente durante la infancia

AMNESIA DISOCIATIVA

Es un trastorno caracterizado por la incapacidad para recordar información personal importante, generalmente relacionada con eventos traumáticos o estresantes. Esta pérdida de memoria no se puede atribuir a una condición médica o neurológica y puede variar en duración y extensión.

TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

Es un trastorno disociativo caracterizado por una sensación persistente o recurrente de estar separado de uno mismo o de la realidad. Las personas que lo padecen pueden sentirse como si estuvieran observando su vida desde fuera de su cuerpo o como si el mundo a su alrededor no fuera real.