NOMBRE DEL ALUMNO: ILSI GABRIELA AGUILAR GONZALES

NOMBRE DEL TEMA:TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS

NOMBRE DE LA MATERIA: PSICOPATOLOGIA II

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL CARMEN BRIONES MARTINEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: LIC. PSICOLOGÍA

CUATRIMESTRE: 7MO CUATRIMESTRE.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS



TRANSTORNOS DE ANCIEDAD/DISOCIATIVO

RASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA

- se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos
- implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de entidad

AMNESIA DISOCIATIVA

- pueden ser cuestiones sentimentales de importancia.

RASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

- Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego.
- El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos.

MUTISMO SELECTIVO

- inhibición del habla y comprender en una, varias o muchas situaciones sociales
- sufren un incremento de la ansiedad en situaciones
- El mutismo selectivo es un cuadro clínico poco frecuente pero importante

FOBIA ESPECIFICA

- estas fobias se inician porque el sujeto ha reaccionado con miedo ante la situación fóbica
- Las fobias más frecuentes son: a los ascensores, pájaros, petardos y fuegos artificiales, tormentas, hematofobia, animales, etc.

FOBIA SOCIAL

- En este caso el estímulo temido, aquello que la persona evita y que le produce ansiedad
- puede limitar mucho su vida
- en un intento de restringir su contacto social tan sólo a personas de su entorno familiar.

TRANSTORNO DE ANCIEDAD DEBIDO DEBIDO A OTRAS AFECCIONES MEDICAS

- Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.

TRANSTORNO DE ANCIEDAD GENERALIZADA

- nos encontramos ante personas que sienten que viven constantemente amenazadas.

TRANSTORNO DE PANICO

- es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos
- La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad.

OTRO TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO

- Se utiliza en situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de ansiedad específico

TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

- la persona se viera desde fuera o como si estuviese alejada de sí misma.
- en sus rutinas o la aparición de situaciones sobre las que no tienen pleno control les provoca una reacción de ansiedad.